

CONCURSO PÚBLICO

POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
DO ESTADO DE GOIÁS

MÉDICO-LEGISTA
DE 3.^a CLASSE

Prova de Verificação de Aprendizagem

INSTRUÇÕES

- Verifique atentamente se este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções na folha de respostas.
- Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado de sua folha de respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

“Ciência é conhecimento organizado.”

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova. Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material, à identificação — que será feita no decorrer da prova — e ao preenchimento da folha de respostas.
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material transparente.
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em qualquer outro meio, que não os permitidos.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e retirar-se da sala.
- Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Ao terminar a prova, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua folha de respostas devidamente assinada e deixe o local de prova.
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

PROVA APLICADA

PROVA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM

QUESTÃO 1

Considerando a fundamentação legal das perícias médicas, assinale a alternativa correta.

- (A) A confissão do réu dispensa a realização do exame de corpo de delito.
- (B) Segundo o Código de Processo Civil, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico, o juiz será assistido por perito.
- (C) Segundo o artigo 3.º do Código de Processo Penal, os exames periciais serão realizados por perito único, designado pelo juiz, que fixará o prazo para entrega do laudo.
- (D) O Código de Processo Penal preconiza que o exame de corpo de delito deve ser realizado preferencialmente durante o dia.
- (E) De acordo com a norma legal vigente, o perito médico-legista deve esperar quatro horas para dar início ao exame cadavérico.

QUESTÃO 2

O conceito pragmático de perícia é: exame de coisas ou pessoas realizado por especialista na matéria, objetivando a elucidação de determinados aspectos técnicos. Em se tratando de perícia médica, é correto afirmar que

- (A) não há previsão legal para perícias facultativas.
- (B) a perícia oficial é aquela que é requerida por uma das partes.
- (C) a perícia requerida é solicitada pelo juiz.
- (D) a perícia indireta é baseada em documentos, pesquisas de campo ou novos documentos.
- (E) o perito médico pode ser nomeado por uma das partes litigantes.

QUESTÃO 3

Existem várias condições de exclusão do perito da perícia médica. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta uma condição para exclusão por impedimento do perito.

- (A) doença pessoal
- (B) impossibilidade de locomoção até o local da perícia
- (C) ser analfabeto e(ou) menor de vinte e um anos de idade
- (D) carência de conhecimento técnico ou científico a respeito do assunto
- (E) deixar de cumprir o encargo no prazo que foi estipulado

QUESTÃO 4

A Medicina Legal deve seguir vários princípios doutrinários, éticos e profissionais para a lide adequada da profissão. Acerca desse tema, assinale a alternativa que apresenta um princípio geral importante nessa área do saber.

- (A) não tipificação do delito
- (B) especificação da causa jurídica da morte
- (C) opinar adequadamente a respeito do mérito da causa
- (D) determinar a posição do agressor
- (E) medicar o periciando quando necessário

QUESTÃO 5

O relatório médico-legal e o parecer são modalidades de documentos médico-legais. Com relação a esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A denominação laudo corresponde ao relatório médico-legal ditado diretamente ao escrivão durante o exame.
- (B) A confissão do acusado pode suprir o exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios.
- (C) O parecer médico-legal é chamado de *peritia percipiendi*.
- (D) O parecer médico-legal é constituído das mesmas partes do relatório médico-legal.
- (E) O exame de lesão corporal deve ser devidamente requisitado pela autoridade policial competente.

QUESTÃO 6

O exame de uma pericianda verificou a presença de uma equimose de coloração esverdeada na face lateral do braço esquerdo. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A descrição da cor e das dimensões da lesão é irrelevante.
- (B) O meio que produziu a ofensa foi ação contundente.
- (C) Não há necessidade de entrevista com a vítima acerca da dinâmica e da data do suposto fato.
- (D) Caso tenha havido atendimento médico, os dados do relatório preenchido pelo assistente são dispensáveis.
- (E) Não há lesão corporal nesse caso; trata-se de vias de fato.

QUESTÃO 7

Acerca da lesão corporal leve, assinale a alternativa correta.

- (A) O tipo subjetivo corresponde ao *animus necandi*.
- (B) A presença de dor, isoladamente, caracteriza lesão corporal.
- (C) A tipificação e a qualificação do crime devem ser colocadas na discussão do laudo pelo médico-legista.
- (D) Cicatrizes extensas em região pubiana, escondidas pelas vestes, são consideradas lesão corporal leve.
- (E) Caracteriza-se pela presença de lesão corporal somada à ausência das consequências previstas nos parágrafos 1.º e 2.º do artigo 129 do Código Penal.

QUESTÃO 8

Um indivíduo com rim único foi vítima de ferimento por projétil de arma de fogo no flanco direito, com necessidade de nefrectomia direita, e compareceu para exame pericial no 28.º dia após o fato, em realização de tratamento dialítico.

Acerca dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta.

- (A) A conclusão do laudo deve relatar que houve debilidade da função renal devido à ação perfurocontundente por lesão corporal dolosa.
- (B) Nesses casos, por se tratar de exame *in vivo*, a descrição do trajeto do projétil é irrelevante.
- (C) Será obrigatória a realização de exame complementar para constatação das qualidades definidoras de lesão corporal gravíssima.
- (D) Há debilidade parcial permanente da função renal.
- (E) Trata-se de lesão corporal gravíssima.

QUESTÃO 9

Uma mulher gestante na 38.^a semana de gravidez foi vítima de agressão física e evoluiu com descolamento de placenta e óbito fetal intrauterino.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de lesão corporal de natureza grave.
- (B) Para caracterização da lesão corporal seguida de aborto, há de se comprovar dolo no antecedente da lesão corporal e no resultado aborto.
- (C) Não há necessidade de se caracterizar, no laudo, as condições anteriores do conceito.
- (D) Se o agente tinha a intenção de provocar a morte do conceito, o crime é de aborto provocado por terceiro.
- (E) Aborto, para a Medicina Legal, é a morte do feto até a 20.^a semana de gestação.

QUESTÃO 10

Um periciando foi vítima de paulada na cabeça que resultou em diabetes *insipidus*.

Considerando esse caso hipotético, assinale a alternativa correta.

- (A) A agressão resultou em enfermidade incurável.
- (B) A agressão resultou em debilidade permanente da função renal.
- (C) Trata-se de lesão corporal de natureza leve.
- (D) Trata-se de vias de fato.
- (E) É irrelevante a verificação de nexo de causalidade no presente caso.

QUESTÃO 11

Com relação aos conceitos de morte sob vários pontos de vista, assinale a alternativa correta.

- (A) A vitalidade de uma célula depende da perfeita integração entre os seus três principais sistemas: membrana celular, metabolismo energético e síntese proteica. A privação da oferta energética atua no desequilíbrio funcional e morfológico de suas estruturas e, a depender da intensidade e da duração, pode provocar a morte e a desintegração celular por meio do mecanismo conhecido como apoptose.
- (B) O marco da mudança conceitual e a entrada definitiva da comunidade médica mundial na era dos transplantes de órgãos vitais deram-se a partir de 1968, quando o cirurgião sul-africano Christian Bernard realizou o primeiro transplante cardíaco, demonstrando a necessidade de revisão dos critérios tradicionais de morte.
- (C) A morte cerebral, também denominada cortical, é um conceito que não considera como vivo o indivíduo que preserve apenas as funções troncocerebrais. A falta de consciência, de percepção, de sentimentos e de qualquer tipo de interação com o meio tornaria lícita a interrupção dos tratamentos de suporte. Esse critério não foi aceito por várias culturas, religiões e sociedades.
- (D) O protocolo de Pittsburgh defende o retorno do critério de morte cardíaca. Pacientes que se enquadrem nos critérios de morte encefálica podem ter os sistemas de suporte desligados, desde que a família e os médicos assistentes entrem em acordo, com a finalidade de aproveitar os órgãos.
- (E) No Brasil, o Conselho Federal de Medicina adotou, com base no conceito de estado vegetativo irreversível, o critério de morte cortical, com testes clínicos e complementares comprovando a falência do córtex superior.

QUESTÃO 12

Acerca dos tipos de morte, é correto afirmar que

- (A) a morte aparente, ou estado cataléptico, é uma condição de profundo embotamento das funções vitais em que se torna muito difícil perceber batimentos cardíacos, pulsação e movimentos respiratórios.
- (B) a morte real baseia-se no conceito adotado pelo Conselho Federal de Medicina de comprovação da ausência de atividade cerebral total (córtex e troncocerebral).
- (C) morte por inibição é um diagnóstico médico-legal que depende do resultado do exame histopatológico das vísceras, visto que o cadáver apresenta poucas e discretas lesões corporais que provocam descompensação de doenças cardíacas ou pulmonares prévias, geralmente desconhecidas pela família.
- (D) mortes súbitas são aquelas provocadas por condições naturais, predominantemente cardiopatias, quando a evolução do quadro é rápida, de alguns minutos a algumas horas.
- (E) são consideradas mortes suspeitas aquelas que podem não ter sido causadas por meio natural, mas sim por elementos relativos ao local ou devido a características próprias do cadáver.

QUESTÃO 13

Com relação à análise de lesões externas de um cadáver durante o procedimento de necropsia, é correto afirmar que

- (A) feridas com bordas retraídas e infiltração hemática podem ter sido causadas intencionalmente após a morte, quando o agressor pretendeu dissimular a real circunstância. Nesse caso, faz-se necessário o estudo histopatológico da lesão.
- (B) feridas provocadas por animais necrófagos podem apresentar características que simulam as provocadas por instrumento de ação contundente, como irregularidade de bordas, edema e eritema. Nesse caso, o diagnóstico diferencial é feito com o estudo histopatológico da lesão.
- (C) o período de incerteza de Tourdes é aquele em que há reação inflamatória tecidual, com edema, migração leucocitária e neocapilarização. Entretanto, torna-se difícil a caracterização do tempo em que ocorreram as lesões pelo estado de decomposição cadavérica.
- (D) as feridas provocadas em vida são aquelas nas quais se observam infiltração hemorrágica tecidual, retração de bordas da lesão e presença de crostas ou coágulos.
- (E) as lesões produzidas pouco tempo antes da morte, bem como aquelas produzidas logo depois, são de fácil diferenciação por médicos-legistas mais experientes, visto que as reações vasculares e inflamatórias cessam imediatamente no momento da parada cardíaca.

QUESTÃO 14

Um paciente de 35 anos de idade chegou ao Instituto Médico Legal (IML) com histórico de mal súbito, queda da própria altura e ferida cortocontusa na região frontotemporal esquerda. Não há histórico de doenças, uso de medicamentos ou uso de drogas. À necropsia, observaram-se ausência de fratura craniana, edema e congestão cerebral, área de hemorragia parenquimatosa e inundação hemorrágica de ventrículo lateral esquerdo. Coração com 450 g e espessamento de parede ventricular esquerda. Ausência de placas ateromatosas. Demais órgãos sem alterações.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica.

- (A) traumatismo crânioencefálico fechado / ação contundente
- (B) rotura de aneurisma sacular
- (C) acidente vascular cerebral / evento tromboembólico
- (D) acidente vascular cerebral hemorrágico / hipertensão arterial sistêmica
- (E) infarto agudo do miocárdio seguido de TCE

QUESTÃO 15

O cadáver de um homem de 52 anos de idade chegou ao IML com histórico de perda da direção e capotamento em rodovia. Ao exame ectoscópico, foram observadas ferida cortocontusa na região frontotemporal esquerda e escoriações nasais malares e labiais. Ausência de hiper mobilidade ou crepitação cervical. Equimose em faixa diagonal na região torácica. Fraturas de tornozelos. Após os procedimentos de abertura, observou-se calota craniana íntegra, sem fratura. Encéfalo com leve edema e congestão. Ausência de hemorragias intracranianas ou fraturas de base. Ausência de fraturas costais. Pulmões edemaciados e congestos. Coração com manchas lácteas e endurecimento de coronárias descendente anterior e circunflexa. Demais vísceras sem alterações. Ao final da necropsia, as vísceras foram acondicionadas em formol a 10% e enviadas para exame histopatológico.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a provável *causa mortis*.

- (A) falência cardíaca súbita / arritmia letal / cardiopatia hipertensiva
- (B) edema pulmonar agudo / trauma contuso torácico
- (C) insuficiência respiratória aguda / tromboembolismo pulmonar
- (D) lesão axonal difusa / TCE fechado / ação contundente
- (E) infarto agudo do miocárdio / cardiopatia isquêmica

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa que apresenta a causa mais frequente de morte súbita em adultos.

- (A) choque anafilático
- (B) cardiopatia aterosclerótica
- (C) tromboembolismo pulmonar
- (D) acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH)
- (E) arritmia cardíaca

QUESTÃO 17

Foi dada a entrada de um corpo de recém-nascido de termo juntamente com a placenta para esclarecimento de *causa mortis* no IML, visto que a família suspeitou de erro médico. Após o exame ectoscópico detalhado sem lesões externas, procedeu-se à abertura mento-pubiana e à inspeção e retirada das vísceras em "massa" (desde a língua até o reto) para posterior dissecação e envio ao laboratório histopatológico.

Considerando esse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a técnica utilizada neste caso.

- (A) Virchow
- (B) Ghohn
- (C) Rokitansky
- (D) Letulle
- (E) Galeno

QUESTÃO 18

A cor dos lívres cadavéricos pode mudar de acordo com a causa da morte. Na intoxicação por monóxido de carbono, os lívres podem assumir a coloração

- (A) amarelada.
- (B) vermelha mais intensa e mais viva.
- (C) pardo-avermelhada.
- (D) laranja.
- (E) vermelho-rosé ou carminada.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que apresenta sinal de morte que é elemento importante de suspeita de mudança na posição do cadáver após a morte.

- (A) rigidez cadavérica
- (B) livor de hipóstase
- (C) sinal de Rebouillat
- (D) circulação póstuma de Brouardel
- (E) esfriamento cadavérico

QUESTÃO 20

O livor *sclerotinae nigrescentes* é um sinal de

- (A) hipóstase visceral.
- (B) esfriamento cadavérico.
- (C) desidratação cadavérica.
- (D) perda de sensibilidade.
- (E) autólise.

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa que apresenta, segundo a Lei de Nysten, a ordem seguida pela rigidez cadavérica.

- (A) Membros inferiores, tronco, membros superiores, pescoço, mandíbula e face.
- (B) Tronco, membros superiores, membros inferiores, pescoço, mandíbula e face.
- (C) Face, mandíbula e pescoço, membros superiores, tronco e membros inferiores.
- (D) Abdome, tronco, membros superiores e membros inferiores.
- (E) Membros superiores, membros inferiores, tronco e mandíbula.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que apresenta os quatro períodos da putrefação.

- (A) Cromático, enfisematoso, liquefação e esqueletização.
- (B) Mancha verde abdominal, desidratação, rigidez e livores.
- (C) Autólise, putrefação, maceração e saponificação.
- (D) Perda da consciência, perda da sensibilidade, imobilidade e cessação da respiração.
- (E) Mumificação, saponificação, calcificação e corificação.

QUESTÃO 23

Quanto às lesões contusas, assinale a alternativa correta.

- (A) Instrumentos de ação contundente não causam lesões abertas, pois, neste caso, atuam como cortocontundentes.
- (B) Um facão não pode causar lesões contusas.
- (C) Nas equimoses, há infiltração de sangue nas malhas dos tecidos, sem efeito de massa.
- (D) Na rubefação, há roturas de pequenos vasos.
- (E) Escoriações produzidas durante a vida ou após a morte têm características semelhantes.

QUESTÃO 24

Com relação às lesões incisivas, assinale a alternativa correta.

- (A) As feridas incisivas são caracteristicamente mais profundas que extensas.
- (B) O sangramento costuma ser abundante nas lesões incisivas.
- (C) A presença da cauda de escoriação tipicamente indica o local onde o instrumento principiou sua ação.
- (D) Feridas cirúrgicas não são lesões incisivas, pois são praticadas com o consentimento do paciente.
- (E) As feridas incisivas na região cervical posterior são conhecidas como esgorjamentos.

QUESTÃO 25

No que se refere às armas de fogo, assinale a alternativa correta.

- (A) O calibre real das armas de alma lisa corresponde à distância medida entre dois cheios opostos.
- (B) Duas armas com o mesmo diâmetro em seus canos têm o mesmo calibre nominal.
- (C) Revólveres têm mais de uma câmara de combustão.
- (D) Espingardas são armas longas de repetição.
- (E) Pistolas são armas curtas automáticas.

QUESTÃO 26

A respeito das lesões causadas por projéteis de arma de fogo, assinale a alternativa correta.

- (A) Orifícios de entrada são circulares.
- (B) Orifícios de entrada de tiros de longa distância não têm orla de contusão.
- (C) O sinal de Werkgaertner caracteriza tiros de curta distância.
- (D) A tatuagem é removida após a lavagem do corpo.
- (E) A câmara de mina de Hoffmann é característica de tiros de encosto na cabeça.

QUESTÃO 27

Quanto ao exame externo do cadáver, é correto afirmar que

- (A) o sinal de Grey-Turner pode indicar hemorragias retroperitoneais.
- (B) o sinal de Cullen indica trauma do sistema urinário.
- (C) o sinal de Battle está presente em hemorragias intraperitoneais.
- (D) equimoses periorbitárias estão presentes em fraturas de calota craniana.
- (E) o sinal de Lachmann sugere luxação do tornozelo.

QUESTÃO 28

Acerca das lesões causadas pela eletricidade, assinale a alternativa correta.

- (A) A metalização é fenômeno comum em acidentes com corrente elétrica de baixa voltagem.
- (B) Em casos de eletroplessão, pode-se encontrar o sinal de Lichtenberg no exame externo.
- (C) Queimaduras extensas e profundas são comuns em acidentes com redes de baixa tensão.
- (D) A marca de Jellinek corresponde a uma lesão branco-amarelada, com bordos elevados e centro deprimido, e pode ser observada em mortes por eletroplessão.
- (E) Os arcos voltaicos são importantes causas de lesão em casos de eletroplessão por redes de baixa voltagem.

QUESTÃO 29

O ácido cianídrico, presente nos casos de intoxicação pela raiz da planta popularmente conhecida como mandioca brava, pode provocar a morte por meio do mecanismo fisiopatológico denominado

- (A) anóxia tissular.
- (B) anóxia circulatória.
- (C) anóxia de ventilação.
- (D) anóxia anêmica.
- (E) anafilaxia.

QUESTÃO 30

Com relação à asfixia por monóxido de carbono, assinale a alternativa correta.

- (A) A forma homicida é mais frequente que a suicida.
- (B) A rigidez cadavérica é a mais precoce e de maior duração.
- (C) Seu mecanismo fisiopatológico é por anóxia de ventilação.
- (D) A afinidade do monóxido de carbono pela hemoglobina é menor que a do oxigênio.
- (E) A face da vítima exibe uma tonalidade rósea característica.

QUESTÃO 31

No que se refere à asfixia mecânica por sufocação direta, assinale a alternativa correta.

- (A) Na sufocação por oclusão da boca e das fossas nasais, modalidade homicida, a desproporção de forças entre a vítima e o agente é desnecessária.
- (B) A sufocação por oclusão das vias respiratórias tem como modalidade mais frequente o homicídio.
- (C) Podem ser visualizadas manchas de Tardieu.
- (D) O sinal de Étienne Martin corresponde ao baço congesto e aumentado de volume.
- (E) É comum o encontro de fraturas do osso hioide.

QUESTÃO 32

Em relação a afogamento, assinale a alternativa correta.

- (A) Os sinais de asfixia são evidentes nos afogados brancos.
- (B) A rigidez e a putrefação são aceleradas e o resfriamento cadavérico é mais rápido.
- (C) É necessária a submersão do corpo.
- (D) As manchas de Paltauf são encontradas mais frequentemente em casos de enforcamento que em casos de afogamento.
- (E) A mancha verde da putrefação inicia-se na pelve.

QUESTÃO 33

Um cadáver foi encontrado em suspensão completa, com laço cervical com nó na parte posterior do pescoço e alça anterior. O exame externo do cadáver evidenciou sulco cervical de direção oblíqua, ascendente, único, apergaminhado, situado acima da cartilagem tireoidea, que se interrompia posteriormente, além de manchas de hipóstase mais intensas na metade inferior do corpo. O exame interno mostrou congestão visceral e equimoses pleurais e pericárdicas. A entrevista com familiares revelou uma história de depressão grave e recorrente, com tratamento psiquiátrico irregular.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta.

- (A) O exame das estruturas internas da região cervical é desnecessário.
- (B) A obstrução circulatória e a compressão de nervos cervicais não têm importância no mecanismo de morte.
- (C) O sinal de Amussat é descrito como sendo a sufusão hemorrágica da túnica externa da carótida comum.
- (D) A rigidez cadavérica é mais tardia no enforcamento.
- (E) Na conclusão do laudo, o médico-legista consignará que o óbito foi decorrente de asfixia mecânica por enforcamento em um caso de suicídio.

QUESTÃO 34

Um cadáver apresentou sulco cervical horizontal, uniforme, contínuo, múltiplo, por baixo da cartilagem tireoidea, com estigmas ungueais adjacentes.

Considerando esse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a modalidade de asfixia mecânica e a causa jurídica da morte mais frequentes, respectivamente.

- (A) estrangulamento - homicídio
- (B) enforcamento - homicídio
- (C) esganadura - acidente
- (D) estrangulamento antebraquial - homicídio
- (E) estrangulamento - suicídio

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa que apresenta os elementos do estupro.

- (A) lesão corporal e conjunção carnal
- (B) violência e grave ameaça
- (C) ato libidinoso e tortura
- (D) conjunção carnal e crueldade
- (E) ato libidinoso e lesão corporal

QUESTÃO 36

Quanto aos crimes contra a liberdade sexual, cabe ao médico-legista determinar se houve conjunção carnal

- (A) e se a vítima era virgem.
- (B) mediante grave ameaça.
- (C) e se da conduta resultou lesão corporal de natureza grave.
- (D) e tortura.
- (E) e qual o meio empregado.

QUESTÃO 37

Para a coleta de material biológico de referência, durante o exame de prática sexual delituosa, são necessários os seguintes materiais:

- (A) máscara e luvas descartáveis.
- (B) lâmina e lamínula.
- (C) tesoura e pinça descontaminadas.
- (D) foco e espéculo vaginal.
- (E) solução de azul de toluidina e lugol.

QUESTÃO 38

Para definir o sítio de coleta de material biológico de referência durante o exame de prática sexual delituosa, é importante constar no histórico do laudo

- (A) a data da última menstruação.
- (B) se o agressor usou preservativo.
- (C) se a vítima era virgem.
- (D) se houve contato oral com o agressor.
- (E) se houve violência para a prática do ato.

QUESTÃO 39

Ao analisar um resultado positivo para pesquisa de espermatozoides de material colhido da vagina de uma vítima de estupro com antecedente de um filho por parto normal, sem histórico de aborto, e com data da última menstruação igual a dez dias antes da coleta do material, é necessário considerar

- (A) a data da última relação sexual consensual.
- (B) se usa anticoncepção hormonal oral.
- (C) se houve coito anal.
- (D) o tipo de violência empregado.
- (E) a data em que ocorreu o parto.

QUESTÃO 40

Quando a pergunta que o quesito faz não se aplica à determinada situação, o termo utilizado para respondê-lo é

- (A) sim.
- (B) não.
- (C) prejudicado.
- (D) sem elementos.
- (E) aguardar.



PROVA APLICADA