

Logomarca da Empresa	MODELO AGRODEFESA	PSO
	Programa de Autocontrole PAC 10	Página 16 de 26
		Rev: 00

Ruptura da vesícula biliar

- Caso haja ruptura da vesícula biliar no momento da evisceração com conseqüente contaminação da carcaça por bÍlis, as mesmas devem ser desviadas para o DIF ou para fora da linha de produção.
- As ½ carcaças deverão passar por rigoroso toailete com remoção de todas as porções contaminadas.
- Lavar e esterilizar a faca a uma temperatura mínima de 85°C entre as operações.

Monitoramento e Frequência

Deverá ser realizado pela empresa, diariamente observando a execução dos procedimentos, avaliando xx ½ carcaças em cada horário.

Possíveis não conformidades e Ações Corretivas

Não Conformidade	Ação Corretiva
Contaminação por bÍlis da carcaça durante a operação de evisceração.	Segregar as ½ carcaças. Realizar toailete nas ½ carcaças. Encaminhar as ½ carcaças para avaliação do SIE.
A não lavagem e esterilização da faca a cada operação.	Lavar e esterilizar a faca a cada operação.
Qualquer uma citada acima.	Retreinar colaborador envolvido na operação.

Registro

PAC 10 PL 01 - Procedimento Sanitário Operacional (PSO).