

Logomarca da Empresa	MODELO AGRODEFESA	PSO
	Programa de Autocontrole PAC 10	Página 18 de 26
		Rev: 00

Toalete

- Revisar o quarto traseiro e dianteiro, com o auxílio de gancho e faca, e retirar possíveis contaminações fecais, gastrointestinal, pêlos, materiais estranhos, dentre outros contaminantes. Retirar ainda músculos do pescoço comprometidos com infiltrações sangüíneas e coágulos decorrentes da sangria, gorduras excedentes em geral, inclusive a gordura inguinal, perirenal e a pélvica além da limpeza de contusões superficiais. Ainda deverá ser removida a cauda, rins, vergalho e os testículos no macho.

Monitoramento e Frequência

Deverá ser realizado pela empresa, diariamente observando a execução dos procedimentos, avaliando xx carcaças em cada horário.

Possíveis não conformidades e Ações Corretivas

Não Conformidade	Ação Corretiva
Presença de contaminação fecal, gastrointestinal, pêlos, materiais estranhos.	Paralisar as atividades, se necessário. Remover as possíveis contaminações.
Presença de infiltrações sangüíneas e coágulos, gorduras excedentes, contusões.	Paralisar as atividades, se necessário. Remover as possíveis contaminações.
Presença de cauda, rins, vergalho e testículos (nos machos).	Paralisar as atividades, se necessário. Remover a cauda, rins, vergalho e testículos (nos machos).
A não esterilização da faca a cada operação.	Esterilizar a faca a cada operação.
Qualquer uma citada acima.	Retreinar colaborador envolvido na operação.

Registro

PAC 10 PL 01 - Procedimento Sanitário Operacional (PSO).