

Logomarca da Empresa	MODELO AGRODEFESA	PSO
	Programa de Autocontrole PAC 10	Página 21 de 26
		Rev: 00

Queda de carcaças e/ou ½ carcaça no piso

- Caso a carcaça e/ou ½ carcaça caia durante as operações, levantar a mesma, com auxílio de guincho (corda e roldana) específico para essa função e recolocá-la no trilho. A corda deverá ser de material lavável e deverá ser lavada sempre que utilizada.
- Desviá-la para o DIF, tomando o cuidado para que a mesma mantenha distância das demais carcaças até o local de inspeção.
- No DIF realizar toailete com objetivo de remover possíveis contaminações e aguardar a destinação pelo Médico Veterinário do SIE.
- Trocar as facas a cada remoção de contaminação, realizando a esterilização das mesmas em esterilizador com a água a temperatura mínima de 85°C.

Monitoramento e Frequência

Deverá ser realizado pela empresa, diariamente quando da ocorrência.

Possíveis não conformidades e Ações Corretivas

Não Conformidade	Ação Corretiva
Toailete ineficiente das carcaças e/ou ½ carcaças.	Realizar novo toailete com a remoção total das possíveis contaminações.
Caso a queda tenha sido relacionada com a falta de manutenção de algum equipamento.	Solicitar manutenção do equipamento para eliminação do desvio.
Qualquer uma citada acima.	Retreinar colaborador envolvido na operação.

Registro

PAC 10 PL 01 - Procedimento Sanitário Operacional (PSO).