

Logomarca da Empresa	MODELO AGRODEFESA	PSO
	Programa de Autocontrole PAC 10	Página 23 de 26
		Rev: 00

Ruptura de abcesso

- Caso haja ruptura de abcesso e a contaminação seja localizada, a 1/2 carcaça deverá passar por rigoroso toaleta na própria linha.
- Caso haja ruptura de abcesso e a contaminação seja generalizada, a 1/2 carcaça é desviada ao DIF e passa por rigoroso toaleta, sendo o destino da mesma definida pelo veterinário do SIE.
- Lavar e esterilizar a faca a uma temperatura mínima de 85°C a cada remoção de contaminação.

Monitoramento e Frequência

Deverá ser realizado pela empresa, diariamente quando da ocorrência.

Possíveis não conformidades e Ações Corretivas

Não Conformidade	Ação Corretiva
Contaminação proveniente da ruptura de abcesso.	Segregar a 1/2 carcaça. Realizar toaleta da contaminação na 1/2 carcaça.
Não remoção da contaminação proveniente da ruptura de abcesso.	Realizar remoção da contaminação.
Remoção ineficiente da contaminação proveniente da ruptura de abcesso.	Realizar nova remoção da contaminação.
A não lavagem e esterilização da faca a cada remoção de contaminação.	Lavar e esterilizar a faca a cada remoção de contaminação.
Qualquer uma citada acima.	Retreinar colaborador envolvido na operação.

Registro

PAC 10 PL 01 - Procedimento Sanitário Operacional (PSO).