

Logomarca da Empresa	MODELO AGRODEFESA	PSO
	Programa de Autocontrole PAC 10	Página 6 de 26
		Rev: 00

Sangria (Bovinos)

- Com uma faca, efetuar a incisão da barbela pela abertura sagital.
- Com outra faca, fazer a secção da aorta anterior, veia cava profunda, carótidas e jugulares.
- Enxaguar as facas na pia e, em seguida, mergulhar as mesmas no esterilizador a uma temperatura mínima de 85°C entre as operações e trocá-las a cada animal.
- Um único operador poderá realizar as duas operações (incisão da barbela e corte de vasos), desde que o mesmo efetue a realização da troca das facas, entre uma operação e outra.

Sangria (Suínos)

- Com a ponta da faca, efetuar o corte da pele usando pressão leve (linha média do pescoço na depressão em frente ao osso do peito);
- Assim que a faca perfurar abaixar o cabo com a ponta da lâmina direcionada à cauda do suíno de forma que corte todos os vasos.
- Enxaguar a faca na pia e, em seguida, mergulhar a mesma no esterilizador a uma temperatura mínima de 82,2°C entre as operações e trocá-la a cada animal.

Monitoramento e Frequência

Deverá ser realizado pela empresa, diariamente observando a execução dos procedimentos, avaliando xx animais em cada horário.

Possíveis não conformidades e Ações Corretivas

Não Conformidade	Ação Corretiva
A não realização da sangria no animal;	Realizar a sangria do animal.
A realização da sangria ineficiente do animal;	Realizar nova sangria do animal.
A não troca de faca durante a operação (bovinos).	Trocar a faca durante a operação.
O escape da faca durante a operação.	Enxaguar e esterilizar a faca, quando da ocorrência.
A não lavagem e esterilização da faca a cada operação.	Lavar e esterilizar a faca a cada operação.
Qualquer uma citada acima.	Re-treinamento do colaborador envolvido na operação.

Registro

PAC 10 PL 01 - Procedimento Sanitário Operacional (PSO).