

Logomarca da Empresa	MODELO AGRODEFESA	PSO
	Programa de Autocontrole PAC 10	Página 7 de 26
		Rev: 00

Retirada da Glândula Mamária

- Ser a primeira operação realizada após a sangria.
- Com uma faca riscar a pele em torno da glândula mamária, tomando cuidado para não perfurá-la.
- Com outra faca, fazer a completa secção da glândula mamária.
- Lavar as facas na pia e, em seguida, mergulhar as mesmas no esterilizador a uma temperatura mínima de 85°C entre as operações e trocá-las a cada animal.

Monitoramento e Frequência

Deverá ser realizado pela empresa, diariamente observando a execução dos procedimentos, avaliando xx animais em cada horário.

Possíveis não conformidades e Ações Corretivas

Não Conformidade	Ação Corretiva
A não retirada da glândula mamária.	Retirar a glândula mamária.
Retirada ineficiente da glândula mamária.	Reparar a retirada da glândula mamária.
Perfuração da glândula mamária com extravasamento de leite ou secreções lácteas, na carcaça.	Desviar ou segregar a carcaça, se necessário. Remover, através de toailete, todas as porções contaminadas da carcaça.
A não lavagem e esterilização da faca a cada operação.	Lavar e esterilizar a faca a cada operação.
Qualquer uma citada acima.	Re-treinar colaborador envolvido na operação.

Registro

PAC 10 PL 01 - Procedimento Sanitário Operacional (PSO).