

Logomarca da Empresa	MODELO AGRODEFESA	PSO
	Programa de Autocontrole PAC 10	Página 8 de 26
		Rev: 00

Esfola do Traseiro

- **Riscagem:** Pegar a faca e riscar o couro com a lâmina da faca voltada para cima na direção contrária ao pêlo (1ª riscagem: efetuada do abdômen até a região do ânus; 2ª riscagem do jarrete até a região do ânus e 3ª riscagem do jarrete até a pata traseira).
- **Esfola:** Realizar a esfola com a faca e com a mão segurar a pele do animal, virando-a para cima, tendo atenção para evitar o contato da parte não esfolada com a parte esfolada.

Esfola da cauda / rabo:

- **Riscagem:** Pegar a faca e riscar o couro do rabo com a lâmina da faca voltada para cima na direção contrária ao pêlo, da região do ânus para a ponta da cauda.
- **Esfola:** Realizar a esfola com a faca e com a mão segurar a pele do rabo, virando-a para cima, tendo atenção para evitar o contato da parte esfolada com a parte não esfolada.

Esfola das patas:

- **Riscagem:** Pegar a faca e riscar o couro das patas com a lâmina da faca voltada para cima na direção contrária ao pêlo, sendo a 1ª riscagem efetuada entre a pata e o joelho.
- **Esfola:** Realizar a esfola com a faca e com a mão segurar a pele, virando-a para cima, tendo atenção para evitar o contato da parte esfolada com a parte não esfolada.

Esfola do dianteiro:

- **Riscagem:** Pegar a faca e riscar o couro com a lâmina da faca voltada para cima na direção contrária ao pêlo (1ª riscagem na direção abdômen até altura do pescoço).
- **Esfola:** Realizar a esfola com a faca ou serrinha (esfoladeira) do matambre esquerdo, do matambre direito e da axila. Com a mão segurar a pele, virando-a para cima, tendo atenção para evitar o contato da parte esfolada com a parte não esfolada.

Esfola da cabeça:

- Fazer a esfola pela parte interna da pele, segurando a parte esfolada para fora a fim de evitar contato com a parte não esfolada.

Obs: Em todas as etapas de esfola, o colaborador deverá fazer a lavagem e esterilização das facas em esterilizador com a água a temperatura mínima de 82,5°C após o término de cada operação.

Monitoramento e Frequência

Deverá ser realizado pela empresa, diariamente observando a execução dos procedimentos, avaliando xx animais em cada horário.

Logomarca da Empresa	MODELO AGRODEFESA	PSO
	Programa de Autocontrole PAC 10	Página 8 de 26
		Rev: 00

Possíveis não conformidades e Ações Corretivas

Não Conformidade	Ação Corretiva
Contaminação da carcaça com pêlo na operação de riscagem.	Desviar ou segregar a carcaça, se necessário. Remover, através de toailete, todas as porções contaminadas da carcaça.
Contaminação da carcaça com pêlo na operação de esfolagem (parte não esfolada com a parte esfolada).	Desviar ou segregar a carcaça, se necessário. Remover, através de toailete, todas as porções contaminadas da carcaça.
A não lavagem e esterilização da faca a cada operação.	Lavar e esterilizar a faca a cada operação.
Qualquer uma citada acima.	Re-treinar colaborador envolvido na operação.

Registro

PAC 10 PL 01 - Procedimento Sanitário Operacional (PSO).