

Logomarca da Empresa	MODELO AGRODEFESA	PSO
	Programa de Autocontrole PAC 10	Página 12 de 26
		Rev: 00

Oclusão do Esôfago

- Com auxílio da mão, abrir o couro e localizar o esôfago, que se situa aderido atrás da traquéia;
- Encaixar o utensílio (saca rolha) no esôfago e deslocá-lo internamente sentido - cauda do animal;
- Atar fortemente a porção inicial do esôfago, com barbante, para evitar a contaminação proveniente do conteúdo ruminal;
- Enxaguar o saca rolha e em seguida mergulhar o mesmo no esterilizador a uma temperatura mínima de 85°C entre as operações.

Monitoramento e Frequência

Deverá ser realizado pela empresa, diariamente observando a execução dos procedimentos, avaliando xx animais em cada horário.

Possíveis não conformidades e Ações Corretivas

Não Conformidade	Ação Corretiva
Contaminação da cabeça com conteúdo ruminal na operação de oclusão do esôfago.	Desviar ou segregar o conjunto cabeça/língua para avaliação do SIE.
Não amarração do esôfago com contaminação da cabeça na operação de separação da cabeça.	Desviar ou segregar o conjunto cabeça/língua para avaliação do SIE.
Amarração ineficiente do esôfago com contaminação da cabeça na operação de separação da cabeça.	Desviar ou segregar o conjunto cabeça/língua para avaliação do SIE.
A não lavagem e esterilização do saca rolha a cada operação.	Lavar e esterilizar o saca rolha a cada operação.
Qualquer uma citada acima.	Re-treinar colaborador envolvido na operação.

Registro

PAC 10 PL 01 - Procedimento Sanitário Operacional (PSO).