

**MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
GT-SINAN**

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVO DE NOTIFICAÇÃO**

**DICIONÁRIO DE DADOS - SINAN NET - Versão 4.0**

**AGRAVO: SIFILIS EM GESTANTE**

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
<b>ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS DA GESTANTE</b>						
<b>31. Ocupação</b>	co_cbo_ocupacao	VARCHAR2(6)			<b>Variável Essencial</b> Tabela de ocupação padronizada do Sinan	ID_OCUPA_N
<b>32. UF</b>	co_uf_prenatal	VARCHAR2(2)		Sigla da Unidade federada do local da realização do pré -natal	<b>Variável Essencial</b>	PRE_UFREL
<b>33. Município de realização do pré-natal</b>	co_municipio_prenatal	VARCHAR2(6)	Código dos municípios - IBGE	Município de localização da Unidade de Saúde de realização do pré-natal	<b>Variável Essencial</b>	PRE_MUNIRE
<b>34. Unidade de realização do pré-natal</b>	co_unidade_prenatal	NUMBER(8,0)	Código de US - CNES	Unidade de Saúde de realização do Pré-Natal.	<b>Variável Essencial</b>	PRE_UNIPRE
<b>35. Nº da gestante no SISPRENATAL</b>	nu_sisprenatal	VARCHAR2(10)		Número identificador da gestante no cadastro do SISPRENATAL.		PRE_SISPRE
<b>36. Classificação Clínica</b>	tp_evidencia_clinica	VARCHAR2(1)	1 Primária 2 Secundária 3 Terciária 4 Latente 9 Ignorado	Classificação clínica da sífilis na gestação 1 - sífilis primária - cancro duro; 2 - sífilis secundária - lesões cutâneo-mucosas (roséolas, sífilides papulosas, condiloma	<b>Variável Essencial</b> <b>Aceita apenas os códigos listados</b>	TPEVIDENCI

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
				plano, alopecia); 3 - sífilis terciária – lesões cutâneo-mucosas (tubérculos ou gomas); alterações neurológicas ( <i>tabes dorsalis</i> , demência); alterações cardiovasculares (aortite sífilítica, aneurisma aórtico); alterações articulares (artropatia de Charcot); 4 - sífilis latente - fase assintomática o diagnóstico apenas é obtido por meio de reações sorológicas.		
<b>DADOS LABORATORIAIS</b>						
<b>37. Teste não treponêmico no pré-natal</b>	tp_teste1	VARCHAR2(1)	1 - Reagente 2 - Não reagente 3 - Não realizado 9 - Ignorado	Refere-se ao resultado do teste não treponêmico preconizado para a primeira consulta de pré-natal. Entende-se como teste não treponêmicos o VDRL e o RPR	<b>Campo Obrigatório</b> Aceita apenas os códigos listados.	TPTESTE1
<b>38. Título</b>	ds_titulo1	VARCHAR2(30)		Resultado da titulação do VDRL/RPR	Campo habilitado e obrigatório se "Teste não treponêmico no pré-natal" = 1	DSTITULO1
<b>39. Data</b>	dt_teste1	DATE	dd/mm/aaaa	Data da realização do teste não treponêmico no pré-natal.	Campo habilitado e obrigatório se " <b>Teste não treponêmico no pré-natal</b> " = 1 ou 2 A data deve ser maior ou igual a data do diagnóstico	DTTESTE1
<b>40. Teste treponêmico no pré-natal</b>	tp_teste_confirmatorio	VARCHAR2(10)	1 - Reagente 2 - Não reagente 3 - Não realizado 9 - Ignorado	Refere-se ao resultado do teste treponêmico, confirmatório, realizado no pré-natal. Os testes	<b>Campo Obrigatório</b> Aceita apenas os códigos listados.	TPCONFIRMA

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
				confirmatórios treponêmicos são indicados na confirmação diagnóstica e exclusão de resultados de testes não treponêmicos falsos positivos. São classificados como testes treponêmicos: FTA-Abs ( <i>Fluorescent Treponemal Antibody-absorption</i> ), MHA-Tp ( <i>Microhemagglutination Treponema pallidum Assay</i> ), TPHA ( <i>Treponema pallidum Hemagglutination Assay</i> ), ELISA ( <i>Enzyme-Linked Immunosorbent Assay</i> ).		
<b>TRATAMENTO / ENCERRAMENTO</b>						
<b>41. Esquema de tratamento</b>	tp_esquema	VARCHAR2(1)	1 – Penicilina G benzatina 2.400.000UI 2 - Penicilina G benzatina 4.800.000UI 3 - Penicilina G benzatina 7.200.000UI 4 – Outro esquema 5 – Não realizado 9 - Ignorado	Esquema de tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde e disponível no Manual de Diretrizes para o Controle da Sífilis Congênita.	<b>Campo Obrigatório</b> Aceita apenas os códigos listados.	TPESQUEMA
<b>Parceiro tratado concomitantemente à gestante</b>		VARCHAR2(1)	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	Verifica se o parceiro foi tratado concomitantemente à gestante		TRATPARC
<b>Esquema de tratamento prescrito ao parceiro</b>		VARCHAR2(1)	1 – Penicilina G benzatina 2.400.000UI 2 - Penicilina G	Esquema de tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde e disponível no Manual de Diretrizes para o		TPESQPAR

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
			benzatina 4.800.000UI 3 - Penicilina G benzatina 7.200..000UI 4 – Outro esquema 5 – Não realizado 9 - Ignorado	Controle da Sífilis Congênita. (para o parceiro)		
<b>Motivo para o não tratamento do Parceiro</b>		VARCHAR2(1)	1 - Parceiro não teve mais contato com a gestante. 2 - Parceiro não foi comunicado/convocado à US para tratamento. 3 - Parceiro foi comunicado/convocado à US para tratamento, mas não compareceu. 4 - Parceiro foi comunicado/convocado à US mas recusou o tratamento. 5 - Parceiro com sorologia não reagente. 6 - Outro motivo	Relata o motivo pelo qual o parceiro não foi tratado		TPMOTPARC
<b>Outro motivo</b>		VARCHAR2(30)		Descreve o outro motivo pelo qual o parceiro não foi tratado	Campo habilitado e <b>obrigatório</b> “Motivo para o não tratamento do Parceiro” = 6	DSMOTIVO