

2016

# Protocolo de vigilância e resposta à ocorrência de microcefalia

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN



# **PROTOCOLO DE VIGILÂNCIA E RESPOSTA À OCORRÊNCIA DE MICROCEFALIA**

## **NOVIDADES DA VERSÃO**

- Ajuste no título do protocolo (capa e contracapa)
- Ajuste na estrutura dos tópicos
- Atualização nos objetivos da vigilância
- Ajuste no texto das definições operacionais de casos para notificação

Brasília – DF

**Versão 1.3**

**GOVERNO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA SAÚDE**

**Marcelo Costa e Castro**

Ministro da Saúde

**José Agenor Álvares da Silva**

Secretário Executivo

**Antônio Carlos Figueiredo Nardi**

Secretário de Vigilância em Saúde

**Alberto Beltrame**

Secretário de Atenção à Saúde

**Eduardo de Azeredo Costa**

Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos

**Lenir dos Santos**

Secretária de Gestão Estratégica e Participativa

**Antônio Alves De Souza**

Secretário Especial de Saúde Indígena

## Elaboração, distribuição e informações

2016 Ministério da Saúde.



Esta obra é disponibilizada nos termos da licença Creative Commons – Atribuição – Não Comercial – Sem Derivações 4.0 Internacional. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.

Tiragem: 2ª edição – 2016 – versão eletrônica

## Elaboração, distribuição e informações

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Vigilância em Saúde

Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis

Coordenação-Geral do Programa de Controle da Dengue

Coordenação Geral de Vigilância e Resposta às Emergências de Saúde Pública

Setor Comercial Sul–Quadra 4 Bloco A, 1º andar

CEP: 70.340-000 – Brasília/DF

Site: <www.saude.gov.br/svs>

E-mail: coes.microcefalias@saude.gov.br

## Produção

Núcleo de Comunicação/SVS

## Organização

Alexandre Fonseca Santos – SVS/MS

Antônio Carlos Figueiredo Nardi – SVS/MS

Cláudio Maierovitch Pessanha Henriques – SVS/MS

Giovanini Evelim Coelho – SVS/MS

Giovanny Vinícius Araújo de França – SVS/MS

Lívia Carla Vinhal – SVS/MS

Marcos da Silveira Franco

Mariana Pastorello Verotti – SVS/MS

Wanderson Kleber de Oliveira – SVS/MS

Wanessa Tenório Gonçalves Holanda De Oliveira – SVS/MS

## Especialistas colaboradores

Adolfo Wenjaw Liao - USP

Adriana Oliveira Melo – IPPJAN/PB

Akemi Suzuki - IAL/SP

Amílcar Tanuri - UFRJ

Ana Maria Bispo de Filippis – Fiocruz/RJ

Ana Van Der Linden – IMIP/PE

Anastácio Queiroz – UFCE

Carlois de Albuquerque e Melo – OPAS/BR

Carlos Alexandre Brito - UFPE

Carolina Alves Pinto Basto – IMIP/PE

Celina Maria Turchi Martelli - Fiocruz

Claudia Duarte dos Santos – Fiocruz/PR

Consuelo Oliveira – IEC/PA

Danielle Di Cavalcanti Cruz – IMIP

Daphne Rattner – UnB

Demócrito Miranda Filho – UPE

Enrique Vasquez- OPAS/BR

Expedito Albuquerque Luna - USP

George Santiago Dimech – SES/PE

Hélio Hehl Caiaffa Filho- IAL/SP

João Bosco Siqueira Júnior – UFG

Joelma Queiroz Andrade - USP

Kleber Giovanni Luz – UFRN

Laura Rodrigues – London School

Lavinia Schuler-Faccini – SBGM

Luciana Albuquerque Bezerra – SES/PE

Marcelo Nascimento Burattini - USP

Marco Aurélio Horta – Fiocruz/RJ

Maria Ângela Wanderley Rocha - UPE

Maria da Glória Teixeira – ISC/UFBA

Marly Cordeiro - Fiocruz/Ageu Magalhães

Mônica Coentro Moraes – IMIP/PE

Paulo Germano de Frias - IMIP

Pedro Fernando Vasconcelos – IEC/PA

Rafael Dhália - Fiocruz/Ageu Magalhães

Rafael França - Fiocruz/Ageu Magalhães

Raimunda Socorro da S. Azevedo – IEC/PA

Regina Coeli Ferreira Ramos - UPE

Ricardo Arraes Ximenes - UFPE

Roberto José da Silva Badaró – SES/BA

Rodrigo G. Stabeli – Fiocruz/RJ

Rodrigo Nogueira Angerami - Unicamp

Romildo Siqueira de Assunção – SES/PE

Suely Guerreiro Rodrigues – IEC/PA

Thalia Velho Barreto de Araujo - UFPE

Vanessa Van der Linden – IMIP/PE

## Colaboradores

Alexander Vargas – SVS/MS

Amanda De Sousa Delacio – SVS/MS

Andrea Fernandes Dias – SVS/MS

Carla Domingues – SVS/MS

Cid de Paulo Felipe dos Santos – SVS/MS

Dácio de Lyra Neto – SVS/MS

Daniel Coradi de Freitas - ANVISA

Diana Carmem de Oliveira – SAS/MS

Eduardo Hage Carmo - Anvisa

Eduardo Saad – SVS/MS

Elisete Duarte – SVS/MS

Elizabeth David Santos – SVS/MS

Fabiana Malapina – SVS/MS

Flávia Caselli Pacheco – SVS/MS

Gabriela Andrade de Carvalho – SVS/MS

Greice Madeleine do Carmo – SVS/MS

Isabela Ornelas Pereira – SVS/MS

Isis Polianna Silva Ferreira – SVS/MS

Jadher Percio – SVS/MS

Jaqueline Martins – SVS/MS

João Roberto C. Sampaio – SVS/MS

José Manoel de Souza Marques – SAS/MS

Juliana Souza da Silva – SVS/MS

Lucia Berto – SVS/MS

Marcelo Yoshito Wada – SVS/MS

Márcia Dieckmann Turcato – SVS/MS

Marcus Quito – SVS/MS

Maria de Fatima Marinho – SVS/MS

Maria Inêz por Deus Gadelha – SAS/MS

Maria Luiza Lawinsky Lodi – SVS/MS

Marília Lavocat Nunes – SVS/MS

Marly Maria Lopes Veiga – SVS/MS

Matheus de Paula Cerroni – SVS/MS

Patricia Miyuki Ohara – SVS/MS

Paula Maria Raia Eliazar – SVS/MS

Priscila Bochi – SVS/MS

Priscila Leal Leite – SVS/MS

Rayana Castro da Paz – SVS/MS

Robson Bruniera de Oliveira – SVS/MS

Suely Nilsa Sousa Esashika – SVS/MS

Synara Cordeiro – SVS/MS

Tatiane F Portal de Lima – SVS/MS

Vaneide Daciane Pedi – SVS/MS

## Revisão técnica

Antônio Carlos Figueiredo Nardi  
Cláudio Maierovitch Pessanha Henriques  
Giovanini Evelim Coelho

Marcos da Silveira Franco  
Wanderson Kleber de Oliveira

## Agradecimentos

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa
- Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde Estaduais e Municipais (CIEVS - SES e SMS)
- Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães/Fiocruz
- Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - Conasems
- Conselho Nacional de Secretários de Saúde - Conass
- Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública – CGLAB/SVS-MS
- Coordenação Geral de Vigilância e Resposta às Emergências em Saúde Pública – CGVR/SVS-MS
- Coordenação Geral do Programa de Controle de Dengue, Chikungunya e Zika vírus – CGPNCD/SVS-MS
- Estudo Colaborativo Latino-Americano de Malformações Congênitas – Eclamc
- Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz
- Instituto Evandro Chagas – IEC/SVS-PA
- Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira – IFF/Fiocruz
- Secretaria de Atenção à Saúde – SAS/MS
- Secretaria Executiva – SE/MS
- Secretarias Estaduais de Saúde - SES
- Secretarias Municipais de Saúde - SMS
- Sociedade Brasileira de Genética Médica – SBGM

## Editora responsável

MINISTÉRIO DA SAÚDE  
Secretaria-Executiva  
Subsecretaria de Assuntos Administrativos  
Coordenação-Geral de Documentação e Informação  
Coordenação de Gestão Editorial

SIA, Trecho 4, lotes 540/610  
CEP: 71.200-040 – Brasília/DF  
Tels.: (61) 3315-7790 / 3315-7794  
Site: <<http://editora.saude.gov.br>>  
E-mail: <[editora.ms@saude.gov.br](mailto:editora.ms@saude.gov.br)>

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

## Ficha Catalográfica

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Protocolo de vigilância e resposta à ocorrência de microcefalia/ Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

55p. : il.

Modo de acesso: [www.saude.gov.br/svs](http://www.saude.gov.br/svs)

ISBN xxx-xx-xxx-xxxx-x

1. Vírus Zika. 2. Plano. 3. Vigilância. I. Título.

CDU 616-002.5

Catálogo na fonte – Coordenação-Geral de Documentação e Informação – Editora MS – OS 2014/0138

## Títulos para indexação

**Em inglês:** Protocol for surveillance and response to the occurrence of microcephaly

**Em espanhol:** Protocolo de vigilancia y respuesta a la ocurrencia de casos de microcefalia

## Sumário

<b>Abreviaturas e siglas</b>	<b>8</b>
<b>Apresentação</b>	<b>9</b>
<b>Capítulo I – Sobre microcefalias</b>	<b>11</b>
Características gerais	11
Outras características	13
Tratamento	14
Microcefalia	14
<b>Capítulo II – Sobre infecção pelo vírus Zika</b>	<b>15</b>
Características gerais	15
Etiologia	17
Transmissão	17
Suscetibilidade	18
Manifestações clínicas	18
Tratamento	19
<b>Capítulo III - Vigilância epidemiológica</b>	<b>20</b>
Objetivos	20
Geral	20
Específicos	20
Definições operacionais de casos	21
Definições de casos para a vigilância de microcefalia	22
Definições de casos para vigilância de infecção pelo vírus zika durante a gestação	24
Notificação	25
Registro de Eventos de Saúde Pública Referente às Microcefalias	25
Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC)	26
Declaração de Nascido Vivo	26
Análise dos dados do RESP-Microcefalia	28
Prevalência	28
Acesso à base de dados do RESP	28
<b>Capítulo IV - Investigação laboratorial</b>	<b>29</b>
Diagnóstico inespecífico	29
Diagnóstico específico	29
Instruções para coleta e encaminhamento de amostras para Diagnóstico Laboratorial	30
Para diagnóstico sorológico	31
Para diagnóstico por RT-PCR (Reação da transcriptase reversa, seguida de reação em cadeia da polimerase)	32
Instruções para coleta e encaminhamento de amostras para Diagnóstico Laboratorial (por RT-PCR e isolamento viral) de Natimorto suspeito de Microcefalia	33
Instruções para coleta e encaminhamento de amostras para Diagnóstico Laboratorial (Histopatológico e Imuno-histoquímica) de Natimorto suspeito de Microcefalia	33
Sorologia e RT-PCR – gestante sem exantema com feto com microcefalia	34
Instruções para Teste Sorológico de gestantes e recém-nascidos com suspeita de infecção pelo vírus Zika	34
Instruções para teste de Biologia Molecular (RT-PCR) de gestantes e recém-nascidos com suspeita de infecção pelo vírus Zika	35
Algoritmo laboratorial para amostras suspeitas de Microcefalia	36
Quadro síntese de definições de casos suspeitos e tipo de exames.	37
<b>Capítulo V - Investigação epidemiológica</b>	<b>39</b>
Objetivos da Investigação Epidemiológica	39
Geral	39
Específicos	39
Roteiro da investigação	39
Entrevistas com as gestantes/puérperas	39
<b>Capítulo VI - Monitoramento e Análise dos Dados</b>	<b>40</b>
Requisitos para acesso ao painel de monitoramento do RESP (Monitor RESP)	40
Acesso à internet	40
Estação de trabalho	40

Programas	40
Navegadores de internet	40
<b>Capítulo VII - Medidas de prevenção e controle</b>	<b>41</b>
<b>Manejo Integrado de Vetores (MIV)</b>	<b>41</b>
<b>Medidas de prevenção pessoal</b>	<b>42</b>
Sobre as vacinas incluídas no Calendário Nacional de Imunização	43
Sobre o uso de repelentes de inseto durante a gravidez	44
Uso de repelentes ambientais para controle do mosquito da dengue e orientações sobre sua utilização por grávidas	45
<b>Educação em saúde, comunicação e mobilização social</b>	<b>46</b>
<b>Referências</b>	<b>47</b>
<b>Anexos</b>	<b>49</b>
<b>Anexo 1. Curvas de crescimento de Fenton para crianças (pré-termo)</b>	<b>49</b>
<b>Anexo 2. Tabela de referência OMS simplificada, para medida do perímetro cefálico (em centímetros) de meninos do nascimento até 2 anos de idade, por desvio padrão em relação.</b>	<b>50</b>
<b>Anexo 3. Curvas de crescimento da OMS para meninas do nascimento até 13 semanas e até 2 anos, em percentis.</b>	<b>51</b>
<b>Anexo 4. Curvas de crescimento da OMS para meninos do nascimento até 13 semanas e até 2 anos, em percentis.</b>	<b>52</b>
<b>Anexo 5. Formulário do RESP para impressão</b>	<b>53</b>
<b>Anexo 6. Acesso ao Monitor RESP</b>	<b>55</b>
Tela de entrada no Monitor RESP	55
Acesso aos Dados	55
Módulo I – Relatórios Compartilhados	56
<b>Anexo 7. Questionário de investigação para microcefalia</b>	<b>61</b>

# Abreviaturas e siglas

AIH	Autorização de Internação Hospitalar
CDC/EUA	Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos da América
CDC/Europa	Centro de Prevenção e Controle de Doenças da União Europeia
CID-10	Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - Décima Revisão
CIEVS	Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde
DATASUS	Departamento de Informática do SUS
ESPII	Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
ESPIN	Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional
MS	Ministério da Saúde
OMS	Organização Mundial da Saúde
RESP	Registro de Eventos em Saúde Pública
RSI	Regulamento Sanitário Internacional
SAS	Secretaria de Atenção à Saúde
SIH	Sistema de Informação Hospitalar
SIM	Sistema de Informação de Mortalidade
SINAN	Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SINASC	Sistema de Informação de Nascidos Vivos
SNC	Sistema Nervoso Central
SUS	Sistema Único de Saúde
SVS	Secretaria de Vigilância em Saúde

# Apresentação

Este protocolo tem como objetivo prover os profissionais de saúde e áreas técnicas de vigilância em saúde com informações gerais, orientações técnicas e diretrizes relacionadas às ações de vigilância das microcefalias e vigilância de vírus zika em gestante, em todo território nacional.

Deve ser ressaltado que as informações e recomendações aqui presentes e agora divulgadas foram fundamentadas e estabelecidas a partir das discussões conduzidas entre áreas técnicas do Ministério da Saúde do Brasil e especialistas de diversas áreas da medicina, epidemiologia, estatística, geografia e laboratório, além de representantes das Secretarias de Saúde de Estados e Municípios afetados.

O Sistema Único de Saúde (SUS) avança para elucidação desse evento e a cada dia acumula novas evidências a partir das investigações realizadas desde outubro de 2015, quando o Ministério da Saúde recebeu as primeiras notificações da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, passando pelo reconhecimento da relação entre a presença do vírus e a ocorrência de microcefalias e óbitos, até a última evidência divulgada de que o vírus atravessa a barreira placentária em janeiro de 2016.

Esse reconhecimento é inédito na literatura nacional e internacional e só foi possível pelo empenho de médicos, pesquisadores e instituições de todo o Brasil que se uniram em prol de um objetivo comum que é a elucidação da causa da ocorrência dessas microcefalias.

Até o momento, foram consolidadas algumas importantes evidências que sustentam a decisão do Ministério da Saúde no reconhecimento desta relação, como:

- Constatação de que os padrões de distribuição dos casos suspeitos de microcefalia pós-infecciosa apresentam características de dispersão e não indicam concentração espacial;
- Constatação de que os primeiros meses de gestação das mulheres com crianças microcefálicas correspondem ao período de maior circulação do vírus Zika na região Nordeste;
- Constatação, após investigação epidemiológica de prontuários e entrevistas com mais de 60 gestantes, que referiram doença exantemática na gestação, cujas crianças nasceram com microcefalia, sem histórico de doença genética na família e/ou com exames de imagem sugestivos de processo infeccioso;
- Constatação de alteração no padrão de ocorrência de microcefalias no SINASC (Sistema de Informação de Nascidos Vivos), apresentando um claro excesso no número de casos em várias partes do Nordeste;
- Observações de especialistas em diversas áreas da medicina (infecologia, pediatria, neuropediatria, ginecologia, genética, etc.) de que há alteração no padrão clínico individual desses casos que apresentam características de comprometimento do Sistema Nervoso Central, similar às infecções congênitas por arbovírus em animais, como descrito na literatura;
- Evidência na literatura de que o vírus Zika é neurotrópico, demonstrado em modelo animal e pelo aumento na frequência de quadros neurológicos relatados na Polinésia Francesa e no Brasil após infecção por Zika e confirmado em Pernambuco, após isolamento do vírus em paciente com síndrome neurológica aguda;
- Identificação de casos de microcefalia também na Polinésia Francesa após notificação do Brasil à Organização Mundial da Saúde;

- Identificação de caso de microcefalia com infecção pelo vírus Zika no Havaí/EUA, cuja gestante tem histórico de viagem ao Brasil em maio de 2015;
- Constatação da relação de infecção pelo vírus Zika com quadros graves e óbitos a partir da identificação de casos que evoluíram para óbito em estados diferentes e ambos com identificação do RNA viral do Zika e resultados negativos para os demais vírus conhecidos, como dengue, chikungunya entre outros;
- Identificação do vírus Zika em líquido amniótico de duas gestantes cujo feto apresentava microcefalia, no interior da Paraíba;
- Identificação e confirmação de infecção pelo vírus Zika em amostras de quatro (4) casos microcefalia e/ou malformações, sendo dois abortamentos e dois recém-nascidos que evoluíram para o óbito em menos de 24 horas e que possuíam padrão sugestivo de infecção congênita no estado do Rio Grande do Norte;
- Identificação de recém-nascido, no estado do Ceará, com diagnóstico de microcefalia durante a gestação e resultado positivo para o vírus Zika, tendo evoluído para óbito nos primeiros 5 minutos de vida.

Sabe-se que as malformações congênitas, dentre elas a microcefalia, têm etiologia complexa e multifatorial, podendo ocorrer em decorrência de processos infecciosos durante a gestação. As evidências disponíveis até o momento indicam fortemente que o vírus Zika está relacionado à ocorrência de microcefalias. No entanto, não há como afirmar que a presença do vírus Zika durante a gestação leva, inevitavelmente, ao desenvolvimento de microcefalia no feto. A exemplo de outras infecções congênitas, o desenvolvimento dessas anomalias depende de diferentes fatores, que podem estar relacionados à carga viral, fatores do hospedeiro, momento da infecção ou presença de outros fatores e condições desconhecidos até o momento. Por isso, é fundamental continuar os estudos para descrever melhor a história natural dessa doença.

O Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios contam com o apoio das instituições e especialistas nacionais, além da participação direta da Rede Mundial de Alerta e Resposta aos Surtos da Organização Mundial da Saúde (OMS), denominada GOARN (Global Outbreak Alert and Response Network). Esta rede coordenada pela OMS é composta por especialistas de vários países e instituições, como o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos da América (CDC/EUA).

Tendo em vista as várias lacunas ainda existentes no conhecimento acerca da infecção pelo vírus Zika, sua patogenicidade, as características clínicas e potenciais complicações decorrentes da infecção causada por esse agente, deve ser ressaltado que as informações e recomendações agora divulgadas são passíveis de revisão e mudanças frente às eventuais incorporações de novos conhecimentos e outras evidências, bem como da necessidade de adequações das ações de vigilância em cenários epidemiológicos futuros. Para isso, solicitamos o apoio e empenho de todos os profissionais e instituições de saúde para que notifiquem toda situação que se enquadrar nas definições de casos vigentes, assim como algum fato não descrito que julgue relevante a ser considerado pela saúde pública.

### **Secretaria de Vigilância em Saúde**

Ministério da Saúde

# Capítulo I – Sobre microcefalias

## Características gerais

As microcefalias, como as demais anomalias congênitas, são definidas como alterações de estrutura ou função do corpo que estão presentes ao nascimento e são de origem pré-natal (1). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e literatura científica internacional, a microcefalia é uma anomalia em que o Perímetro Cefálico (PC) é menor que dois (2) ou mais desvios-padrão (DP) do que a referência para o sexo, a idade ou tempo de gestação (1–7). A medida do PC é um dado clínico fundamental no atendimento pediátrico, pois pode constituir-se na base do diagnóstico de um grande número de doenças neurológicas e para isso os médicos e outros profissionais de saúde devem estar familiarizados com as doenças mais frequentes que produzem a microcefalia e devem conhecer os padrões de normalidade para o crescimento do crânio (3).

Em 22 de outubro de 2015, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco notificou e solicitou apoio do Ministério da Saúde para complementar as investigações iniciais de 26 casos de microcefalia, recebida de diversos serviços de saúde nas semanas anteriores à notificação. Por se tratar de evento raro e comparando com o perfil clínico e epidemiológico dessa doença no Estado, concluiu-se que se tratava de evento de importância para a saúde pública estadual. Desde então, o Ministério da Saúde apoiou e continua apoiando as investigações em Pernambuco e nos demais Estados da Região Nordeste, tendo notificado a OMS em 23 de outubro de 2015, conforme fluxo do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) (8). Naquele momento, uma das principais hipóteses sob investigação era a infecção pelo vírus Zika, potencializando a ocorrência de microcefalias e das demais causas conhecidas como outras infecções virais, exposição a produtos físicos, químicos ou fatores genéticos.

Em 24 de novembro de 2015, foi publicada a “Avaliação Rápida de Risco – Microcefalia no Brasil potencialmente relacionada à epidemia de vírus Zika”, realizada pelo Centro de Controle de Doenças da União Europeia (ECDC). Neste documento, é relatado que a Polinésia Francesa notificou um aumento incomum de pelo menos 17 casos de malformações do Sistema Nervoso Central em fetos e recém-nascidos durante 2014-2015, coincidindo com o Surto de Zika vírus nas ilhas da Polinésia Francesa. Nenhuma das gestantes relataram sinais de infecção pelo vírus Zika, mas em quatro testadas foram encontrados anticorpos (IgG) para flavivírus em sorologia, sugerindo infecção assintomática. Do mesmo modo que no Brasil, as autoridades de saúde da Polinésia Francesa também acreditam que o vírus Zika pode estar associado às anomalias congênitas, caso as gestantes estivessem infectadas durante o primeiro ou segundo trimestre de gestação (9).

Em 28 de novembro de 2015, com base nos resultados preliminares das investigações clínicas, epidemiológicas e laboratoriais, além da identificação do vírus em líquido amniótico de duas gestantes da Paraíba com histórico de doença exantemática durante a gestação e fetos com microcefalia, e da identificação de vírus Zika em tecido de recém-nascido com microcefalia que evoluiu para óbito no estado do Ceará, o Ministério da Saúde reconheceu a relação entre o aumento na prevalência de microcefalias no Brasil com a infecção pelo vírus Zika durante a gestação (8,10). No dia seguinte, 29 de outubro, mudou a classificação desse evento, no âmbito do RSI, para potencial Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) (8).

As malformações congênitas, dentre elas a microcefalia, têm etiologia complexa e multifatorial, envolvendo fatores genéticos e ambientais; algumas das causas mais comuns estão descritas na Tabela 2.

A identificação da microcefalia se dá principalmente pela medição do Perímetro Cefálico (PC), procedimento comum no acompanhamento clínico do recém-nascido, visando à identificação de doenças neurológicas (2).

A medição do perímetro cefálico é feita com fita métrica não-extensível, na altura das arcadas supraorbitárias, anteriormente, e da maior proeminência do osso occipital, posteriormente. Os valores obtidos devem ser registrados em gráficos de crescimento craniano, o que permite a construção da curva de cada criança e a comparação com os valores de referência. Mudanças súbitas no padrão de crescimento e valores anormalmente pequenos para a idade e o peso (menor que dois desvios-padrão) devem ser investigados. A medida do PC é importante nos primeiros dois anos de vida, refletindo, até certo ponto, o crescimento cerebral (2).

**Tabela 2. Etiologias mais comuns para ocorrência de microcefalia (congênita e pós-parto)**

<b>CONGÊNITA</b>	<b>PÓS-PARTO</b>
<b>Genética</b>	<b>Genética</b>
<b>Adquirida</b>	<b>Adquirida</b>
<b>Traumas disruptivos</b> Acidente Vascular Cerebral hemorrágico	<b>Traumas disruptivos (como AVC);</b> Lesão traumática no cérebro
<b>Infecções</b> Sífilis Toxoplasmose Rubéola Citomegalovírus Herpes simples HIV Outros vírus	<b>Infecções</b> Meningites Encefalites Encefalopatia congênita pelo HIV
<b>Teratógeno</b> Álcool Radiação Diabetes materna mal controlada	<b>Toxinas</b> Intoxicação por cobre Falência renal crônica


**Fonte:** adaptado de Practice parameter: Evaluation of the child with microcephaly (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology [Internet]. 2009 Sep 15 [cited 2015 Dec 6];73(11):887–97. Disponível em: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2744281&tool=pmcentrez&rendertype=abstract>

A microcefalia relacionada ao vírus Zika é uma doença nova que está sendo descrita pela primeira vez na história e com base no surto que está ocorrendo no Brasil (20). No entanto, caracteriza-se pela ocorrência de microcefalia com ou sem outras alterações no Sistema Nervoso Central (SNC) em crianças cuja mãe tenha histórico de infecção pelo vírus Zika na gestação.

Apesar de o período embrionário ser considerado o de maior risco para múltiplas complicações decorrentes de processo infeccioso, sabe-se que o sistema nervoso central permanece suscetível a complicações durante toda a gestação (Figura 1). Assim, o perfil de gravidade das complicações da infecção

pelo vírus Zika na gestação dependerá de um conjunto de fatores, tais como: estágio de desenvolvimento do conceito, relação dose-resposta, genótipo materno-fetal e mecanismo patogênico específico de cada agente etiológico.

**Figura 1 – Período de formação de órgãos e sistemas durante a gestação**



Fonte: Manual de Obstetrícia de Williams - Complicações na Gestação - 23ª Ed. (2014)

A microcefalia não é uma doença transmissível. Sua ocorrência está relacionada à exposição a fatores biológicos, químicos, físicos e genéticos (1,3,6).

### Outras características

A microcefalia é um evento raro. Segundo Ashwal e colaboradores, se considerarmos que o perímetro cefálico seja normalmente distribuído, significa que 2,3% das crianças poderiam ser classificadas como microcefálicas. No entanto, estimativas publicadas para perímetro cefálico menor que dois (2) desvios-padrão ao nascimento são muito baixos, entre 0,54-0,56%. A diferença pode ser explicada por uma distribuição não-normal, desenvolvimento pós-natal de microcefalia, ou averiguação incompleta (5-7). Os casos graves de microcefalia podem ser esperados em 0,1% das crianças e 0,14% dos neonatos, assumindo distribuição normal (7).

A microcefalia pode ser acompanhada de epilepsia, paralisia cerebral, retardo no desenvolvimento no desenvolvimento cognitivo, motor e fala, além de problemas de visão e audição (7).

## Tratamento

### Microcefalia

Não há tratamento específico para a microcefalia. Existem ações de suporte que podem auxiliar no desenvolvimento do bebê e da criança, e este acompanhamento é preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Como cada criança desenvolve complicações diferentes entre elas respiratórias, neurológicas e motoras, o acompanhamento por diferentes especialistas vai depender das funções que ficarem comprometidas.

Estão disponíveis serviços de atenção básica, serviços especializados de reabilitação, serviços de exame e diagnóstico e serviços hospitalares, além de órteses e próteses aos casos em que se aplicar.

Com o aumento de casos no ano de 2015, o Ministério da Saúde elaborou o **“Protocolo de atenção e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus zika”**, em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, um protocolo de atendimento voltado a essas crianças. Este protocolo vai servir como base de orientação aos gestores locais para que possam identificar e estabelecer os serviços de saúde de referência no tratamento dos pacientes, além de determinar o fluxo de atendimento.

# Capítulo II – Sobre infecção pelo vírus Zika

## Características gerais


O vírus Zika recebeu a mesma denominação do local de origem de sua identificação em 1947, após detecção em macacos sentinelas para monitoramento da febre amarela, na floresta Zika, em Uganda (11,12).

O Ministério da Saúde começou a receber notificações e monitorar casos de doença exantemática sem causa definida na Região Nordeste a partir do final do mês de fevereiro de 2015, com relato de casos nos estados da Bahia, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Paraíba, todos os casos apresentando evolução benigna com regressão espontânea, mesmo sem intervenção clínica, com mais de 6.800 casos identificados até aquele momento (13). Em 29 de abril, pesquisadores da Universidade Federal da Bahia anunciam a identificação do vírus Zika (14,15). Seguindo o fluxo de investigação laboratorial, os achados foram validados pelo Laboratório de Referência Nacional para arbovírus, o Instituto Evandro Chagas, no estado do Pará, em 14 de maio de 2015 (16).


Embora a primeira evidência de infecção humana pelo vírus Zika tenha ocorrido em 1952, a comunidade internacional somente passou a reconhecer o potencial epidêmico do vírus Zika a partir de 2005 e principalmente após o surto de 2007 na Oceania – Figura 1 (11,17,18).

**Figura 1.** Distribuição dos vírus Zika e Chikungunya antes de 2005 e sua expansão no mundo e na Oceania, entre 2005 e 2015.

**Circulação do vírus Zika e Chikungunya até 2005, no mundo.**




**Emergências por vírus Zika e Chikungunya de 2005 até 2015, no mundo.**



Fonte: Musso D, Cao-Lormeau VM, Gubler DJ. Zika virus: following the path of dengue and chikungunya? Lancet (London, England) [Internet]. Elsevier; 2015 Jul 18 [cited 2015 Nov 24];386(9990):243–4. Available from: <http://www.thelancet.com/article/S0140673615612739/fulltext>

No Brasil, a circulação de Zika vírus foi confirmada por meio de exames laboratoriais, em 21 unidades da federação, distribuídas nas cinco regiões do país (Figura 4) - (19).

**Figura 4** – Unidades da Federação com confirmação laboratorial de Zika vírus. Brasil, 2015.



Fonte: Coordenação-Geral do Programa Nacional de Controle da Dengue (CGPNCD/DEVIT/SVS). Dados atualizados em 16/01/2016.

É impossível conhecer o número real de infecções pelo vírus Zika, pois é uma doença em que cerca de 80% dos casos infectados não irão manifestar sinais ou sintomas da doença e grande parte dos doentes não irá procurar serviços de saúde, dificultando ainda mais o conhecimento da magnitude dessa doença. Além disso, até o momento não há teste sorológico (IgM e IgG) em qualidade e quantidade disponível, restringindo-se apenas na identificação do vírus por isolamento ou PCR (Reação de cadeia de polimerase) no quadro agudo da doença.

Considerando **todas as limitações**, estimou-se o número de casos de infecções pelo vírus Zika a partir dos casos descartados para dengue e projeção com base na literatura internacional. Deste modo, a estimativa de casos de infecção pelo vírus Zika no Brasil, para 2015, pode estar entre 497.593 a 1.482.701 casos, considerando apenas os Estados com circulação autóctone do vírus Zika, confirmada por laboratório de referência (Tabela 1). É importante destacar que a maior parte desses casos não irá procurar os serviços médicos por apresentar quadro assintomático ou oligosintomático. Projeções mais precisas estão sendo realizadas por institutos de pesquisa brasileiros.

**Tabela 1** – Projeção de infecções pelo vírus Zika em estados com confirmação laboratorial para 2015.

Unidade Federada	Estimativas de infecções pelo vírus zika		Unidade Federada	Estimativas de infecções pelo vírus zika	
	Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior
Alagoas	4.023	29.066	Paraná	42.008	97.118
Amazonas	3.119	34.264	Pernambuco	34.579	81.303
Bahia	19.216	132.274	Piauí	3.237	27.875
Ceará	38.485	77.469	Rio de Janeiro	15.918	143.985
Espírito Santo	6.481	34.190	Rio Grande do Norte	4.761	29.947
Maranhão	1.481	60.067	Rondônia	2.911	15.383
Mato Grosso	8.202	28.410	Roraima	1.450	4.399
Pará	6.357	71.400	São Paulo	236.494	386.249
Paraíba	6.013	34.558	Tocantins	8.767	13.182
			<b>Brasil</b>	<b>443.502</b>	<b>1.301.140</b>

Obs.: Os parâmetros utilizados para essa estimativa foram os casos descartados de dengue para o limite inferior e as proporções de casos ocorridos na Polinésia Francesa com base na população de cada estado. Esses valores servem apenas para a reflexão sobre o potencial de dispersão desse vírus que possui mais de 80% dos casos assintomáticos ou oligosintomáticos.

## Etiologia

O vírus Zika é um arbovírus do gênero Flavivírus, família Flaviviridae, cuja possível associação com a ocorrência de microcefalia não havia sido identificada anteriormente. Até o momento, são conhecidas e descritas duas linhagens do vírus Zika, uma africana e outra asiática (11,12). Esta última é a linhagem identificada no Brasil e estudos publicados em 25 de novembro de 2015 indicam adaptação genética da linhagem asiática para maior infectividade em humanos (21).

## Transmissão

O modo mais importante de transmissão do vírus Zika é por meio da picada do mosquito *Aedes aegypti*, mesmo transmissor da dengue e chikungunya e o principal vetor urbano das três doenças (12,17). O *Aedes albopictus* também apresenta potencial de transmissão do vírus Zika e, devido à ampla distribuição, o combate ao vetor se configura a principal arma contra a disseminação dessas doenças (12). Em relação às demais vias de transmissão, a identificação do vírus em líquido amniótico indica que este atravessa a barreira transplacentária, sendo esta a via de maior importância devido ao risco de dano ao embrião.

A identificação do vírus na urina, leite materno, saliva e sêmen pode ter efeito prático apenas no diagnóstico da doença. Por isso, não significa que essas vias sejam importantes para a transmissão do vírus para outra pessoa. Estudos realizados na Polinésia Francesa não identificaram a replicação do vírus em amostras do leite, indicando a presença de fragmentos do vírus que não seriam capazes de produzir doença. No caso de identificação no sêmen, ocorreu apenas um caso descrito nos Estados Unidos da América e a doença não pode ser classificada como sexualmente transmissível, e também não há descrição de transmissão por saliva (10,22–24).

## Suscetibilidade

Considerando que o vírus Zika possa ter sido introduzido no Brasil a partir da segunda metade de 2014 e ocasionando uma nova doença por não ter circulado anteriormente no país, considera-se que a maior parte da população brasileira seja suscetível à infecção e não possua imunidade natural contra o vírus Zika. Além disso, ainda não há vacina para prevenir contra infecção pelo vírus Zika. Até o momento, não há evidência de que a imunidade conferida pela infecção natural do vírus Zika seja permanente. Afeta todos os grupos etários e ambos os sexos.

## Manifestações clínicas

A infecção pelo vírus Zika, à luz do conhecimento atual, é uma doença febril aguda, autolimitada na maioria dos casos e que, via de regra, não vinha sendo associada a complicações; leva a uma baixa taxa de hospitalização (17,25).

De modo geral, estima-se que apenas 20%, cerca de 2 em cada 10, das pessoas infectadas com o vírus Zika ficarão doentes, sendo a infecção assintomática a mais frequente (17,25).

Desde que começou a circular no Brasil os especialistas observaram que o padrão da doença é caracterizado por febre baixa (menor do que 38,5°C) ou sem febre, durando cerca de 1 a 2 dias, acompanhada de exantemas no primeiro ou segundo dia, dor muscular leve, dor nas articulações de intensidade leve a moderada, frequente observação de edema nas articulações de intensidade leve, prurido e conjuntivite não purulenta em grande parte dos casos – Tabela 3 (15).

Formas graves e atípicas são raras, mas quando ocorrem podem excepcionalmente evoluir para óbito, como identificado no mês de novembro de 2015 pela primeira vez na história (10). Essas descrições estão em fase de caracterização e publicação pelas Universidades Federais do Rio Grande do Norte e de Pernambuco.

Os sinais e sintomas ocasionados pelo vírus Zika, em comparação aos de outras doenças exantemáticas (dengue, chikungunya e sarampo), incluem um quadro exantemático mais acentuado e hiperemia conjuntival, sem alteração significativa na contagem de leucócitos e plaquetas. Em geral, o desaparecimento dos sintomas ocorre entre 3 e 7 dias após seu início. No entanto, em alguns pacientes, a artralgia pode persistir por cerca de um mês (12).

Além da microcefalia, a infecção pelo vírus Zika também está relacionada à síndrome neurológica, como a Síndrome de Guillain-Barré (SGB) (9,12,15,17,20,26).

Na Micronésia, a incidência histórica média de SGB era de 5 casos por ano. Durante um surto do vírus Zika naquela região, foram diagnosticados 40 casos de SGB, ou seja, um número 20 vezes maior do que o normalmente observado. Situação semelhante foi observada na Polinésia (12,26).

No Brasil, a ocorrência de síndrome neurológica relacionada ao vírus Zika foi confirmada em julho de 2015, após investigações da Universidade Federal de Pernambuco, a partir da identificação do vírus em amostra de seis (6) paciente com histórico de infecção de doença exantemática. Destes, 5 (cinco) foram identificados em soro e 1 (um) em líquido cefalorraquidiano (LCR), sendo que 4 (quatro) tiveram diagnóstico de Síndrome de Guillain-Barré e 2 (dois) de encefalomielite aguda disseminada (ADEM). Metade dos casos eram do sexo feminino; idade variando de 2 a 57 anos. O tempo entre as manifestações

clínicas de Zika e o quadro neurológico variou de 4 a 19 dias. O padrão clínico-epidemiológico não diferiu dos demais casos suspeitos que ainda estão sob investigação laboratorial.

**Tabela 3.** Frequência de sinais e sintomas mais comuns de infecção pelo vírus Zika em comparação com a infecção pelos vírus da dengue e chikungunya, segundo observações da Universidade Federal de Pernambuco, até dezembro de 2015.

Sinais/Sintomas	Dengue	Zika	Chikungunya
<b>Febre (duração)</b>	Acima de 38°C (4 a 7 dias)	Sem febre ou subfebril ≤ 38°C (1-2 dias subfebril)	Febre alta > 38°C (2-3 dias)
<b>Manchas na pele (Frequência)</b>	Surge a partir do quarto dia 30-50% dos casos	Surge no primeiro ou segundo dia 90-100% dos casos	Surge 2-5 dia 50% dos casos
<b>Dor nos músculos (Frequência)</b>	+++/>+++	++/>+++	+/>+++
<b>Dor na articulação (frequência)</b>	+/>+++	++/>+++	+++/>+++
<b>Intensidade da dor articular</b>	Leve	Leve/Moderada	Moderada/Intensa
<b>Edema da articulação</b>	Raro	Frequente e leve intensidade	Frequente e de moderada a intenso
<b>Conjuntivite</b>	Raro	50-90% dos casos	30%
<b>Cefaleia (Frequência e intensidade)</b>	+++	++	++
<b>Prurido</b>	Leve	Moderada/Intensa	Leve
<b>Hipertrofia ganglionar (frequência)</b>	Leve	Intensa	Moderada
<b>Discrasia hemorrágica (frequência)</b>	Moderada	ausente	Leve
<b>Acometimento Neurológico</b>	Raro	Mais frequente que Dengue e Chikungunya	Raro (predominante em Neonatos)

**Fonte:** Carlos Brito – Professor da Universidade Federal de Pernambuco (atualização em dezembro/2015)

## Tratamento

Não existe tratamento específico para a infecção pelo vírus Zika. O tratamento recomendado para os casos sintomáticos é baseado no uso de acetaminofeno (paracetamol) ou dipirona para o controle da febre e manejo da dor. No caso de erupções pruriginosas, os anti-histamínicos podem ser considerados.

Não se recomenda o uso de ácido acetilsalicílico e outros anti-inflamatórios, em função do risco aumentado de complicações hemorrágicas descritas nas infecções por outros flavivírus.

Os casos suspeitos devem ser tratados como dengue, devido à sua maior frequência e gravidade conhecida.

# Capítulo III - Vigilância epidemiológica

## Objetivos

### Geral

Descrever o padrão epidemiológico de ocorrência de microcefalias relacionadas a infecções no território nacional.

### Específicos

- Garantir o registro no RESP (Registro de Eventos em Saúde Pública) de todos os casos de microcefalia, para que a Atenção à Saúde possa identificar e acompanhar os que apresentam sinais de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), independente da causa da microcefalia;
- Identificar entre os casos notificados como microcefalia, aqueles que apresentam alterações típicas sugestivas de infecção congênita (calcificações, alterações nos ventrículos cerebrais etc.), para que a Vigilância em Saúde possa monitorar o padrão epidemiológico dos casos de microcefalia relacionados às infecções congênitas;
- Investigar os casos de microcefalia sugestivos de infecções congênitas para identificação da doença ou agente relacionado, como: vírus zika, sífilis, toxoplasmose, outros agentes infecciosos (dengue, chikungunya, HIV etc.), rubéola, citomegalovírus, herpes vírus, descritos pelo acrônimo adotado como Z-STORCH;
- Identificar os casos de microcefalia e/ou malformações do Sistema Nervoso Central em fetos, abortamentos e natimortos cuja suspeita seja de relação com infecção congênita;
- Identificar, em todas as unidades de saúde, as gestantes que procuram o serviço apresentando exantema agudo (até o 5º dia a partir da data de aparecimento do exantema) sugestivo de infecção pelo vírus Zika, para descrever o padrão de ocorrência da doença nessa população específica;
- Descrever as características das complicações relacionadas à infecção pelo vírus Zika, na gestação e no pós-parto;
- Orientar a utilização das medidas de prevenção e controle disponíveis;
- Elaborar e divulgar informações epidemiológicas.

## Definições operacionais de casos

Para melhor compreensão das definições já publicadas, foram realizados ajustes nas definições operacionais a serem adotadas pelos serviços de saúde, com a finalidade de identificar e registrar todos os casos de nascidos vivos com microcefalia identificada na medida antropométrica, independentemente da causa. Também foram realizados ajustes nas demais definições.

As definições de casos operacionais aqui contidas foram baseadas em evidências científicas, na literatura internacional e em parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, foram realizadas análises das curvas de sensibilidade e especificidade dos casos registrados até o momento, a partir das investigações de campo e casos registrados em 2015, que serviram de base para os ajustes apresentados nessa versão.

Tais definições tem a finalidade exclusivamente operacional no âmbito da saúde pública e teve apoio de especialistas nas diversas áreas médicas, da Sociedade Brasileira de Genética Médica, com o suporte da equipe do SIAT (Sistema Nacional de Informação sobre Agentes Teratogênicos).

Idealmente, o resultado da medição do perímetro cefálico de um recém-nascido para caracterização de um caso de microcefalia deveria ser comparado a um gráfico de perímetro cefálico de acordo com a idade gestacional e sexo do paciente. No entanto, optou-se por fixar um valor de referência operacional para recém-nascidos a termo, 32,0 cm de perímetro cefálico, cuja medida igual ou inferior a esse valor será considerada para notificação do caso como microcefalia.

É sabido, que esse valor representa percentil 2,6 para meninos e 5,6 para meninas, tanto no gráfico de PC adotado pela OMS quanto pelo CDC/EUA. Apesar da medida de referência para meninas ser um pouco mais baixo, 31,5 cm, foi mantido o valor de referência em 32,0 cm para ambos os sexos, exclusivamente para facilitar a operação nos serviços de saúde de modo mais simplificado possível. Além disso, as análises dos dados até então registrados, mostram que o total de notificações referentes a diferença de 0,5 cm para meninas (PC de 31,5 cm a 32,0 cm) não são significativas para impactar na capacidade de investigação. Estas orientações podem ser ajustadas futuramente.

É importante destacar que no caso do parto normal, o trabalho de parto pode levar à justaposição dos ossos do crânio, que voltam a se acomodar após algumas horas. Por isso, no caso de recém-nascidos de parto normal com a medida de perímetro cefálico pouco menor do que o limite inferior definido neste protocolo, a aferição deve ser repetida após 24 horas ou no momento da alta.

No âmbito da avaliação clínica, é recomendado que o médico considere outros aspectos e informações que o permita classificar o caso, orientar a mãe e familiares, além de encaminhar para o serviço especializado, quando necessário, independentemente da obrigatoriedade de notificar à Secretaria de Saúde.

A investigação da causa da microcefalia será realizada somente nos casos notificados que apresentem características clínicas e/ou laboratoriais sugestivas de infecção congênita, visando a identificação da infecção pelo vírus zika entre outros agentes infecciosos.

Anteriormente, até a semana epidemiológica 49/2015 (12/12/2015), o Ministério da Saúde havia adotado critério mais sensível para caracterização da microcefalia para conseguir captar um maior número

de casos, utilizando 33 cm de perímetro cefálico como ponto de corte para recém-nascidos a termo, mas isso representava um percentil de 12,5 para recém-nascidos meninos e percentil 23 para meninas. Dessa forma, muitas crianças normais poderiam ser incluídas como caso suspeito de microcefalia e serem submetidas desnecessariamente a exames de imagem que envolvem radiação (como uma tomografia computadorizada por exemplo), além de gerar angústia desnecessária aos pais.

## Definições de casos para a vigilância de microcefalia

### A) RECÉM-NASCIDO (RN) COM MICROCEFALIA

- **Caso notificado como microcefalia:**
  - RN com menos de 37 semanas de idade gestacional, apresentando medida do perímetro cefálico abaixo do percentil 3, segundo a curva de Fenton, para o sexo (anexo 1) **OU**
  - RN com 37 semanas ou mais de idade gestacional, apresentando medida do perímetro cefálico menor ou igual a 32,0 cm ao nascer, segundo as referências da OMS (anexo 3 e 4).
- **Caso confirmado de recém-nascido com microcefalia relacionada à infecção congênita:**
  - **Por critério Clínico-radiológico:** caso notificado de RN como microcefalia **E** que apresente alterações sugestivas de infecção congênita por qualquer método de imagem **E/OU**
  - **Por critério Clínico-laboratorial:** caso notificado de RN como microcefalia **E** que apresente diagnóstico laboratorial específico e conclusivo para vírus zika ou para qualquer outro agente infeccioso (Z-STORCH<sup>1</sup>), identificado em amostras do RN ou da mãe.
- **Caso descartado de microcefalia relacionada à infecção congênita:** Caso notificado como microcefalia com resultado normal (sem alteração sugestiva de infecção congênita) por qualquer método de imagem **OU** por critérios clínicos após investigação.
- 

### B) NATIMORTO COM MICROCEFALIA E/OU MALFORMAÇÕES DO SNC SUGESTIVAS DE INFECÇÃO CONGÊNITA

- **Caso notificado:** Natimorto apresentando malformações do SNC **E/OU** microcefalia<sup>2</sup>
- **Caso confirmado de natimorto com microcefalia e/ou malformações do SNC relacionada à infecção congênita:** Caso notificado que apresente alterações características de infecção congênita diagnosticada por qualquer método de imagem **E/OU** diagnóstico laboratorial específico e conclusivo para vírus zika ou para qualquer outro agente infeccioso (Z-STORCH<sup>1</sup>), em amostras da mãe ou no tecido fetal.
- **Caso descartado de natimorto com microcefalia e/ou malformações do SNC relacionada à infecção congênita:** Caso notificado sem alterações sugestivas de infecção congênita **OU** cujo diagnóstico laboratorial não seja conclusivo para agente infeccioso (Z-STORCH<sup>1</sup>).

<sup>1</sup> **Z-STORCH:** acrônimo composto pelas iniciais de Zika vírus, Sífilis, Toxoplasmose, outros agentes infecciosos, Rubéola, Citomegalovírus, Herpes Vírus.

<sup>2</sup> Ver definição de caso notificado de Recém-nascido com microcefalia.

### C) ABORTO ESPONTÂNEO SUGESTIVO DE INFECÇÃO CONGÊNITA

- **Caso notificado:** Gravidez interrompida involuntariamente até a 22ª semana de gestação E com suspeita clínica e/ou laboratorial de infecção congênita.
- **Caso confirmado de aborto espontâneo relacionado à infecção congênita:** caso notificado que apresente diagnóstico laboratorial específico e conclusivo para vírus zika ou para qualquer outro agente infeccioso (Z-STORCH<sup>1</sup>), em amostras de tecido fetal.
- **Caso descartado:** caso suspeito cujo diagnóstico laboratorial não seja conclusivo para qualquer agente infeccioso (Z-STORCH<sup>1</sup>).

### D) FETO COM MICROCEFALIA E/OU ALTERAÇÕES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC), SUGESTIVO DE INFECÇÃO CONGÊNITA

- **Caso notificado:** achado ultrassonográfico de feto com alteração do SNC sugestivo de infecção congênita E/OU com circunferência craniana (CC) aferida menor que dois desvios-padrão (< 2 dp) abaixo da média para a idade gestacional.
- **Caso confirmado feto com microcefalia e/ou alterações do SNC relacionada à infecção congênita:** caso notificado com diagnóstico laboratorial específico e conclusivo para vírus zika ou para qualquer outro agente infeccioso (Z-STORCH<sup>3</sup>), em amostras da mãe.
- **Caso descartado feto com microcefalia e/ou alterações do SNC relacionada à infecção congênita:** Caso notificado de feto que apresente resultado normal/sem alteração em segunda avaliação por qualquer método de imagem OU por critérios clínicos após investigação OU que tenha nascido com perímetro cefálico normal

## Definições de casos para vigilância de infecção pelo vírus zika durante a gestação

Devido à necessidade de se conhecer a magnitude de ocorrência de infecção pelo vírus Zika na gestação, cuja notificação foi iniciada desde a última versão do Protocolo de Microcefalia, o Ministério da Saúde considera que, apenas para essa condição, a notificação seja realizada a partir de todo serviço de saúde (**notificação universal**).

É importante informar que a vigilância de zika vírus para as demais condições permanece como notificação a partir de **unidade sentinela**, conforme as diretrizes previstas no “Protocolo para implantação de Unidades Sentinelas para Zika vírus” disponível no site [www.saude.gov.br/svs](http://www.saude.gov.br/svs).

## GESTANTE COM EXANTEMA AGUDO SUGESTIVO DE INFECÇÃO PELO VÍRUS ZIKA

- **Caso suspeito:** Toda grávida, em qualquer idade gestacional, com doença exantemática aguda, excluídas as hipóteses não infecciosas.
- **Caso confirmado de gestante com infecção pelo vírus zika:** Caso suspeito com diagnóstico laboratorial conclusivo para vírus Zika.
- **Caso descartado de gestante com infecção pelo vírus zika:** Caso suspeito com identificação da causa do exantema que não seja a infecção por vírus Zika.

## Notificação

A suspeita precoce, notificação adequada e registro oportuno de casos de microcefalia relacionados ao vírus Zika é fundamental para desencadear o processo de investigação, visando classificar os casos notificados (confirmar ou descartar), bem como subsidiar as ações de atenção à saúde e descrição dessa nova doença.

Considerando que o surto de microcefalia relacionada ao vírus Zika é um evento, até então, incomum/inesperado, que se trata de uma Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, dado o seu potencial impacto em âmbito nacional, recomenda-se que todas as ações devem ser desencadeadas e conduzidas em caráter de urgência; e considerando que o SINASC apresenta um tempo de atualização dos nascimentos de até 90 dias, faz-se necessário que os casos suspeitos de microcefalia potencialmente relacionada à infecção pelo vírus Zika sejam notificados imediatamente às autoridades de saúde e registrados em um instrumento de registro específico e ágil, elaborado pelo Ministério da Saúde com o objetivo de possibilitar a análise, consolidação e caracterização do evento.

## Registro de Eventos de Saúde Pública Referente às Microcefalias

Recomenda-se que todos os casos suspeitos de microcefalia relacionada ao vírus Zika, sejam registrados no formulário de Registro de Eventos de Saúde Pública (RESP – Microcefalias), online e disponível no endereço eletrônico [www.resp.saude.gov.br](http://www.resp.saude.gov.br) (Figura 2) pelos serviços públicos e privados de saúde. Uma nova versão do sistema está sendo elaborada para adequação às novas definições de casos.

**Figura 2 - Formulário eletrônico para envio das informações**

A imagem mostra a interface de um navegador web acessando o sistema RESP. O endereço na barra de endereços é [resp.saude.gov.br/microcefalia#/painel](http://resp.saude.gov.br/microcefalia#/painel). O cabeçalho do sistema apresenta o logo "RESP" e o texto "Registro de Eventos em Saúde Pública", além da versão "V. 1.2.1" e um botão "Login".

O conteúdo principal do formulário é intitulado "Investigação e resposta ao aumento de ocorrências de microcefalias no Brasil". Ele contém os seguintes campos e seções:

- Data da notificação:** Campo de data com máscara de entrada e ícone de calendário.
- Notificação de:** Menu suspenso com a opção "-- Selecione --".
- Dados para identificação da gestante ou puérpera:** Seção com o texto: "Informe os dados sobre a gestante ou puérpera para que a vigilância possa realizar a investigação com o instrumento detalhado. Esta é apenas uma comunicação inicial."
- Nome da mãe:** Campo de texto.
- Número do prontuário:** Campo de texto.
- Tipo de documento:** Menu suspenso com a opção "-- Selecione --".
- Número do Cartão SUS, CPF ou RG:** Campo de texto.
- Data de Nascimento:** Campo de texto.
- Idade da mãe:** Campo de texto.

Observações (Obs.): se não tiver documento coloque 0 em todo o; Obs.: se não souber coloque a data 31/12/2015; Obs.: se não tiver documento coloque 99 em todo o.

Nota: disponível no endereço [www.resp.saude.gov.br](http://www.resp.saude.gov.br).

Este formulário é composto por uma série de perguntas relacionadas à gestante ou puérpera, recém-nascido ou lactente, e contém informações sobre a gestação e parto, dados clínicos, epidemiológicos e local de ocorrência do parto. Para facilitar o preenchimento, algumas orientações estão inseridas no formulário.

Além disso, informações detalhadas encontram-se no Instrucional de Preenchimento do Formulário (Anexo I). Esse formulário foi baseado na ficha de registro de casos suspeitos de microcefalia do estado de Pernambuco e adaptado pela equipe do Ministério da Saúde. Neste momento, não há orientação de digitação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

A partir da notificação dos casos suspeitos no RESP-Microcefalia, as informações serão incluídas em um banco de dados único, online, cujos dados poderão ser acessados somente pela Unidade Federada (UF) do local de residência da gestante ou puérpera.

O RESP-Microcefalia tem como objetivo agregar as notificações em um único local de forma a permitir a gestão adequada das informações relacionadas ao evento. No entanto, é importante destacar que o referido banco de dados com as respectivas notificações não compõe um sistema de informação e não substituem a investigação. **Os dados poderão ser utilizados para melhor compreender a magnitude do evento de saúde pública em cada Unidade Federada e subsidiar os gestores quanto aos aspectos logísticos e operacionais da etapa de investigação dos casos.** Esta deverá ser realizada utilizando-se outro formulário.

## Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC)

O SINASC é o sistema de informação oficial para registro de todos os casos identificados no pós-parto. O Ministério da Saúde implantou o SINASC a partir de 1990, com o objetivo principal de fornecer informações sobre as características dos nascidos vivos, fundamentais para o estabelecimento de indicadores de saúde específicos.

Aos gestores do SINASC, orienta-se que:

- Não retenham arquivos de transferência (AT) do SINASC gerados por municípios nas SES.
- Lancem no Sisnet todos os AT que tenham recebido dos municípios e os que venham a receber. Sabemos que muitas SES trabalham com cronograma de envio para o nível Federal, mas neste momento, pedimos que priorizem a agilidade.
- Intensifiquem o trabalho de aprimoramento do preenchimento das variáveis sobre anomalia congênita presentes na DN (campo 6 e 41), orientando os profissionais dos serviços a comunicarem todas as anomalias observadas em cada recém-nascido que apresente múltiplas anomalias, e aos digitadores, que digitem no SINASC todas as anomalias informadas na DN, sem priorização e sem tentar substituir múltiplas anomalias em diagnósticos sindrômicos.

### Declaração de Nascido Vivo

A Declaração de Nascido Vivo é um documento padrão de uso obrigatório em todo o território nacional para a coleta dos dados sobre nascidos vivos e considerado documento hábil para a lavratura da Certidão de Nascimento pelo Cartório de Registro Civil (Art. 11 da Portaria nº116 MS/SVS/2009 e Art. 51 da Lei nº 6.015/1973). As variáveis sobre anomalias congênitas na DN devem ser informadas seguindo as orientações do manual de preenchimento que serão destacadas a seguir.

Figura 3 - Identificação do recém-nascido na Declaração de Nascido Vivo

 <b>República Federativa do Brasil</b> <b>Ministério da Saúde</b> 1ª VIA - SECRETARIA DE SAÚDE		<b>Declaração de Nascido Vivo</b>		<b>30-67352501-7</b>	
1 Nome do Recém-nascido (RN)			Número do Cartão Nacional de Saúde do RN 700 0068 7032 8700		
Data e hora do nascimento		3 Sexo		a) Raça cor do Recém-nascido	
2 Data		M - Masculino    I - Ignorado F - Feminino		1 Branca    3 Amarela    5 Indígena 2 Preta    4 Parda	
4 Peso ao nascer		5 Índice de Apgar		6 Detectada alguma anomalia congênita?	
em gramas		1º minuto    5º minuto		Caso afirmativo, usar o bloco anomalia congênita para descrevê-las 1 Sim    2 Não    9 Ignorado	

### Campo 6 (Bloco I): “Detectada alguma anomalia congênita?”

Assinalar com um “X” a quadrícula correspondente. Caso exista alguma anomalia congênita detectável no momento do nascimento, informar sua presença neste campo e fazer uma descrição completa no campo 41 do Bloco VI (Anomalia congênita).

### Campo 41 (Bloco VI): “Descrever todas as anomalias congênitas observadas”

Este bloco, com apenas um campo e de natureza descritiva, será preenchido quando o campo 6 do Bloco I tiver assinalada a opção “1. Sim”. Nele serão informadas as anomalias congênitas verificadas pelo responsável pelo parto.

41 Descrever todas as anomalias congênitas observadas

Compete ao médico diagnosticar as anomalias congênitas. Deve ser estimulado o registro de todas as anomalias observadas, sem hierarquia ou tentativa de agrupá-las em síndromes.

Orienta-se priorizar a descrição e desestimular o uso de códigos, exceto se codificado por neonatologistas, pediatras ou geneticistas. A codificação qualificada das anomalias descritas deverá ser realizada preferencialmente em um segundo momento por pessoas capacitadas para esta função. Portanto, quanto mais bem descrita(s), melhor será o trabalho de codificação.

### *Importante*

A notificação do caso suspeito de microcefalia no RESP não exclui a necessidade de se notificar o mesmo caso no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).

## Análise dos dados do RESP-Microcefalia

### Prevalência

No âmbito da vigilância das microcefalias, a palavra “incidência” não é adequada para descrever a ocorrência de anomalias congênitas, pois o termo se refere a todos os novos casos de anomalias congênitas. No entanto, os abortos espontâneos não podem ser contados com acurácia. Deste modo, segundo a OMS, o termo adequado para media da ocorrência é “prevalência de nascidos vivos”, “prevalência de nascimentos” ou “prevalência total” (1).

No Brasil, as microcefalias são monitoradas por meio do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), com o código Q.02. Análises recentes demonstram que houve um grande aumento na prevalência de microcefalia ao nascer em 2015, especialmente nos meses de outubro e novembro. Além disso, foram consolidadas importantes evidências que corroboram o reconhecimento da relação entre a presença do vírus Zika e a ocorrência de microcefalias no país (19).

### Acesso à base de dados do RESP

O acesso aos registros dos casos notificados no RESP-Microcefalia somente poderá ser realizado por usuários cadastrados. O usuário deverá acessar o endereço eletrônico <http://dw.saude.gov.br> e inserir seus dados de login e senha. Após essa etapa, deverá seguir os passos que estão descritos no Anexo.

Cada usuário será responsável pela realização das suas análises. Para melhorar a acurácia da informação, é importante, previamente à análise dos dados, que seja avaliada a qualidade dos dados inseridos e que se procedam devidas correções, como por exemplo, exclusão de duplicidades, identificação e correção de variáveis incompletas.

Embora o Ministério da Saúde tenha acesso a todos os registros de casos do país, o RESP ainda não contém todos os registros nacionais de casos suspeitos. Por esse motivo, somente serão considerados aqueles dados informados oficialmente pelas SES. Por esse motivo, solicita-se que seja enviado diariamente um resumo dos dados para o e-mail [notifica@saude.gov.br](mailto:notifica@saude.gov.br), até às 16 horas (horário de Brasília). Até o momento, os dados solicitados referem-se ao número acumulado de casos suspeitos de microcefalia por UF e município. No entanto, dados adicionais poderão ser solicitados a qualquer momento. Estes dados serão utilizados para, dentre outras finalidades, elaborar documentação para tomada de decisão.

De forma geral, o MS divulga os dados nacionais semanalmente, às terças-feiras, após a reunião do COES, por meio de um informe epidemiológico. Entretanto, devido às características da emergência de saúde pública, novas comunicações extraordinárias poderão ocorrer em qualquer momento.

# Capítulo IV - Investigação laboratorial

## Diagnóstico Inespecífico


Os exames inespecíficos devem ser solicitados a fim de complementar a investigação estadiamento dos casos. Durante o curso da doença, poderão ser identificadas alterações em diversos exames laboratoriais, tais como: discretas a moderadas leucopenia e trombocitopenia; e ligeira elevação da desidrogenase láctica sérica, gama glutamiltransferase e de marcadores de atividade inflamatória (proteína C reativa, fibrinogênio e ferritina). Por esse motivo, são recomendados os seguintes exames complementares:

- Hemograma
- Dosagem sérica de AST/TGO e ALT/TGP
- Dosagem sérica de bilirrubinas direta/indireta
- Dosagem de ureia e creatinina
- Dosagem sérica de lactato desidrogenase e outros marcadores de atividade inflamatória (proteína C reativa, ferritina)
- Ecocardiograma
- Avaliação oftalmológica com exame de fundo de olho
- Exame de emissão otoacústica
- Ultrassonografia de abdômen
- Tomografia de crânio computadorizada sem contraste

## Diagnóstico específico

O diagnóstico laboratorial específico de vírus Zika baseia-se principalmente na detecção de RNA viral a partir de espécimes clínicos. O período virêmico ainda não está completamente estabelecido, mas acredita-se que seja de curta duração. Desta forma, seria possível a detecção direta do vírus em um período de 4 a 7 dias após do início dos sintomas. Entretanto, recomenda-se que o exame do material seja realizado, idealmente, até o **5º dia** do aparecimento dos sintomas (Figura 4).

**Figura 4 – Oportunidade de detecção do Zika vírus segundo técnica laboratorial (isolamento, reação em cadeia da polimerase via transcriptase reversa – RT-PCR – e sorologia – IgM/IgG)**



Fonte: Adaptado de Sullivan Nicolaides Pathology (2014).

No Brasil, o exame preconizado para confirmação de vírus Zika é a reação em cadeia da polimerase via transcriptase reversa (RT-PCR), realizada em laboratórios de referência da rede do Sistema Único de Saúde (SUS). Até o momento, não existem ensaios sorológicos comerciais disponíveis para a detecção de anticorpos específicos para o vírus Zika. Há, entretanto, um esforço coletivo dos laboratórios de referência para o desenvolvimento de plataformas para realização de provas sorológicas específicas.

## Instruções para coleta e encaminhamento de amostras para Diagnóstico Laboratorial

Diante do contexto do aumento dos casos de microcefalia e da circulação do vírus Zika e da possível associação entre eles, a Coordenação Geral de Laboratórios (CGLAB) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), elaborou seu plano de ação para o fortalecimento do sistema de laboratórios (SISLAB) com o fornecimento de insumos e equipamentos para realização dos exames, apoiando os laboratórios de referência na capacitação de pessoal técnico e incorporação de novas tecnologias no diagnóstico de Zika Vírus.

Dentro da rede de laboratórios temos atualmente: 22 Laboratórios Centrais (AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MS, MG, PA, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, SC, SP, SE) equipados para a realização da técnica de biologia molecular para qualquer agravo, sendo 17 Laboratórios Centrais (AC, AL, AP, AM, CE, DF, ES, GO, MS, MG, PA, PR, PE, RJ, RN, RS e SP) capacitados na técnica de RT-PCR em tempo real para realização do diagnóstico de Dengue, 16 Laboratórios Centrais (AC, AM, BA, CE, DF, ES, MT, MS, MG, PA, PR, PE, PI, RJ, RR e SP) capacitados na técnica de RT-PCR em tempo real para realização do diagnóstico de Chikungunya e 12 Laboratórios Centrais (AP, AM, DF, GO, PA, PR, PE, RN, BA, AI, SE SP) capacitados na técnica de RT-PCR em tempo real para realização do diagnóstico de Zika vírus.

Nos dias 24 e 25 de novembro de 2015 ocorreu no Hotel San Marco, em Brasília, uma reunião com especialistas em diagnóstico laboratorial de arbovírus, para definição e elaboração de um protocolo laboratorial a ser adotado pelos laboratórios de referência que fazem parte da rede sentinela para Zika vírus (Fiocruz/RJ, Fiocruz/PR, Fiocruz/PE, Instituto Evandro Chagas -IEC/PA e Instituto Adolfo Lutz - IAL/SP).

Atualmente, estes laboratórios já realizam 10 amostras semanais/unidade de cobertura para vírus Zika, conforme acordado com a área técnica do Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), para a sua rede referenciada pactuada anteriormente; diante do contexto atual devido ao aumento de casos de microcefalia, ficou acordado nessa reunião que os laboratórios da rede sentinela realizarão a partir desta data um acréscimo de exames devido a sua capacidade instalada no momento, conforme abaixo:

- Fiocruz-PR: (10+10) 20 amostras semanais por UF de cobertura (PR, SC, RS);
- Fiocruz-RJ: (10+20)30 amostras semanais por UF de cobertura (RJ, ES e MG);
- Fiocruz-PE: 10 amostras semanais por UF de cobertura (PE, PB e RN);
- IAL-SP: (10 + 10) 20 amostras semanais por UF de cobertura (SP, MT, MS, GO E DF);
- IEC-PA: (10+10) 20 amostras semanais por UF de cobertura (AC, RR, RO, TO, AM, AP, PA, MA, PI, CE, AL, SE, BA).

Para diagnóstico sorológico

Tipo de Material	Procedimento de coleta	Armazenamento e conservação	Acondicionamento e transporte <sup>1</sup>
Sangue (Soro)	Coletar cerca de 10 ml de sangue, sem anticoagulante, da mãe sendo a 1ª coleta 3 a 5 dias após o início dos sintomas e a 2ª coleta após 2 a 4 semanas. Separar no mínimo 2 a 3 ml do soro, para sorologia.  No caso do RN, coletar 2 a 5 ml de sangue (preferencialmente do cordão umbilical), sem anticoagulante, e separar 0,5 a 1,0 ml de soro para sorologia.	Utilizar tubo plástico estéril com tampa de rosca e anel de vedação. Rotular o tubo com o nome do paciente, data da coleta e tipo de amostra.  <b>Conservar em freezer a 20°C.</b>	Acondicionar em caixa de transporte de amostra biológica (Categoria B UN/3373) com gelo reciclável.  -
Sangue (soro) de cordão umbilical	Coletar 2 a 5 ml de sangue, sem anticoagulante, do RN no momento do nascimento.	Utilizar tubo plástico estéril com tampa de rosca e anel de vedação. Rotular o tubo com o nome do paciente, data da coleta e tipo de amostra.  <b>Conservar em freezer a 20°C.</b>	Acondicionar em caixa de transporte de amostra biológica (Categoria B UN/3373) com gelo reciclável.  -
Líquor	Coletar 1 ml do RN no momento do nascimento.	Utilizar tubo plástico estéril com tampa de rosca e anel de vedação. Rotular o tubo com o nome do paciente, data da coleta e tipo de amostra.  <b>Conservar em freezer a 20°C.</b>	Acondicionar em caixa de transporte de amostra biológica (Categoria B UN/3373) com gelo reciclável.  -

<sup>1</sup> Incluir na remessa a(s) ficha(s) com dados clínicos e epidemiológicos do(s) paciente(s).

Para diagnóstico por RT-PCR (Reação da transcriptase reversa, seguida de reação em cadeia da polimerase)

Tipo de Material	Procedimento de coleta	Armazenamento e conservação	Acondicionamento e transporte <sup>1</sup>
Sangue/soro	Coletar cerca de 10ml de sangue, sem anticoagulante, da mãe até 3 a 5 dias após o início dos sintomas. Separar no mínimo 2 a 3 ml do soro, para a RT-PCR. No caso do RN, coletar 2 a 5 ml de sangue (preferencialmente do cordão umbilical), sem anticoagulante, e separar 0,5 a 1,0 ml de soro para a RT-PCR.	Utilizar tubo plástico estéril, resistente à temperatura com tampa de rosca e anel de vedação. Rotular o tubo com o nome do paciente, data da coleta e tipo de amostra. <b>Conservar em freezer a -20 ou -70°C (preferencialmente) até o envio para o laboratório.</b>	Acondicionar em caixa de transporte de amostra biológica (Categoria B UN/3373) com gelo seco.
Sangue (soro) de cordão umbilical	Coletar 2 a 5 ml de sangue, sem anticoagulante, do RN no momento do nascimento.	Utilizar tubo plástico estéril, com tampa de rosca e anel de vedação. Rotular o tubo com o nome do paciente, data da coleta e tipo de amostra. <b>Conservar em freezer a -20 ou -70°C (preferencialmente) até o envio para o laboratório.</b>	Acondicionar em caixa de transporte de amostra biológica (Categoria B UN/3373) com gelo seco.
Líquor	Coletar 1 ml do RN no momento do nascimento.	Utilizar tubo plástico estéril, resistente a temperatura, com tampa de rosca e anel de vedação. Rotular o tubo com o nome do paciente, data da coleta e tipo de amostra. <b>Conservar em freezer a -20 ou -70°C (preferencialmente) até o envio para o laboratório.</b>	Acondicionar em caixa de transporte de amostra biológica (Categoria B UN/3373) com gelo seco.
Urina (gestante com RASH)	Coletar 10 ml até 8 dias após o início dos sintomas.	Utilizar tubo plástico estéril, resistente à temperatura, com tampa de rosca e anel de vedação. Rotular o tubo com o nome do paciente, data da coleta e tipo de amostra. <b>Conservar em freezer a -20 ou -70°C (preferencialmente) até o envio para o laboratório.</b>	Acondicionar em caixa de transporte de amostra biológica (Categoria B UN/3373) com gelo seco
Placenta	Coletar 3x3 cm da placenta no momento do nascimento.	Obter 3 fragmentos de placenta (dimensões de 1cm <sup>3</sup> cada), de tecido não fixado e transferir para frasco estéril, resistente a temperatura, com tampa de rosca. Identificar o material (placenta) e rotular o frasco com o nome do paciente e data da coleta. <b>Conservar em freezer a -20 ou -70°C (preferencialmente) até o envio para o laboratório.</b>	Acondicionar em caixa de transporte de amostra biológica (Categoria B UN/3373) com gelo seco.

<sup>1</sup> Incluir na remessa a(s) ficha(s) com dados clínicos e epidemiológicos do(s) paciente(s).

Instruções para coleta e encaminhamento de amostras para Diagnóstico Laboratorial (por RT-PCR e isolamento viral) de Natimorto suspeito de Microcefalia

Tipo de Material	Procedimento de coleta	Armazenamento e conservação	Acondicionamento e transporte <sup>1</sup>
Vísceras	Coletar 1cm <sup>3</sup> de cérebro, fígado, coração, pulmão, rim e baço do natimorto	Utilizar tubo plástico estéril sem NENHUM tipo de conservante (seco), resistente à temperatura ultra baixa com tampa de rosca e boa vedação. Colocar o fragmento de cada víscera em tubos separados. Rotular os tubos com o nome do paciente, data de coleta e tipo de víscera. <b>Conservar em freezer a -20 ou -70°C (preferencialmente) até o envio para o laboratório.</b>	Acondicionar em caixa de transporte de amostra biológica (Categoria B UN/3373) com gelo seco.

<sup>1</sup> Incluir na remessa a(s) ficha(s) com dados clínicos e epidemiológicos do(s) paciente(s).

Instruções para coleta e encaminhamento de amostras para Diagnóstico Laboratorial (Histopatológico e Imuno-histoquímica) de Natimorto suspeito de Microcefalia

Tipo de Material	Procedimento de coleta	Armazenamento e conservação	Acondicionamento e transporte <sup>1</sup>
Vísceras	Coletar 1cm <sup>3</sup> de cérebro, fígado, coração, pulmão, rim e baço do natimorto	Utilizar frasco estéril, com tampa de rosca, contendo formalina tamponada a 10%. Rotular o frasco com o nome do paciente, data da coleta e tipo de amostra. <b>Conservar em temperatura ambiente.</b>	Acondicionar em caixa de transporte de amostra biológica (Categoria B UN/3373) <b>SEM GELO</b> . <b>Conservar em temperatura ambiente.</b>

<sup>1</sup> Incluir na remessa a(s) ficha(s) com dados clínicos e epidemiológicos do(s) paciente(s).

## Sorologia e RT-PCR – gestante sem exantema com feto com microcefalia

Instruções para Teste Sorológico de gestantes e recém-nascidos com suspeita de infecção pelo vírus Zika

	<b>GESTANTE SEM RASH COM FILHO MICROCEFÁLICO</b>	<b>GESTANTE COM RASH COM OU SEM FILHO MICROCEFÁLICO</b>	<b>RECÉM-NASCIDO COM MICROCEFALIA</b>
<b>SOROLOGIA (Amostras positivas no ELISA IgM serão submetidas ao PRNT)</b>			
<b>PROCEDIMENTO</b>	2 Coletas	2 Coletas	1 Coleta
<b>AMOSTRA</b>	Soro	Soro	Sangue (soro), Cordão Umbilical, Líquor
<b>VOLUME</b>	2-3 ml	2-3 ml	3ml Sangue (soro), Cordão Umbilical e 1 ml Líquor
<b>TEMPO</b>	<b>1ª COLETA:</b> Momento da confirmação da microcefalia do feto  <b>2ª COLETA:</b> 2 a 4 semanas após a 1ª coleta	<b>1ª COLETA:</b> Até 3 a 5 dias após o início dos sintomas  <b>2ª COLETA:</b> 2 a 4 semanas após a 1ª coleta	Momento do nascimento

Instruções para teste de Biologia Molecular (RT-PCR) de gestantes e recém-nascidos com suspeita de infecção pelo vírus Zika


	<b>GESTANTE SEM RASH COM FILHO MICROCEFÁLICO</b>	<b>GESTANTE COM RASH COM OU SEM FILHO MICROCEFÁLICO</b>	<b>RECÉM-NASCIDO COM MICROCEFALIA</b>
<b>Biologia Molecular (PCR real time)</b>			
<b>PROCEDIMENTO</b>	1 Coleta	1 Coleta	1 Coleta
<b>AMOSTRA</b>	Soro	Soro* e Urina	Sangue* (soro), Cordão Umbilical, Líquor e Placenta
<b>VOLUME</b>	2-3 ml Soro	2-3 ml Soro e 10 ml Urina	3 ml Sangue, Cordão Umbilical e 1 ml Líquor e Placenta
<b>TEMPO</b>	Momento da confirmação da microcefalia do feto	SORO: 0 a 5 dias após início dos sintomas URINA: até 8 dias após início dos sintomas	Momento do nascimento

### ***ABORTO OU NATIMORTO***

Coletar 1cm<sup>3</sup> de cérebro, fígado, coração, pulmão, rim e baço para realização de RT-PCR e Imuno-histoquímico.

## Algoritmo laboratorial para amostras suspeitas de Microcefalia

### Algoritmo laboratorial para amostras suspeitas de microcefalia relacionada ao vírus Zika



1. As amostras de soro devem ser submetidas às análises para Dengue, Chikungunya e STORCH (Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes)
2. As amostras de urina serão coletadas apenas em gestantes para realização de diagnóstico por RT-PCR
3. Lacen que não realizar RT-PCR para vírus Zika, encaminhar ao Laboratório Sentinela de sua área.

**Observação:** em caso de aborto ou natimorto, coletar 1cm<sup>3</sup> de cérebro e fígado e coração e pulmão e rim e baço para realização de RT-PCR e Imuno-histoquímico.

## Quadro síntese de definições de casos suspeitos e tipo de exames.

GRUPO	EXAME LABORATORIAL ESPECÍFICO PARA DIAGNOSTICO DE VÍRUS ZIKA	EXAME LABORATORIAL PARA OUTRAS CAUSAS INFECCIOSAS
<p><b>Gestante com possível infecção pelo vírus zika durante a gestação</b></p> <p>– Toda grávida, em qualquer idade gestacional, com doença exantemática aguda, excluídas outras hipóteses de doenças infecciosas e causas não infecciosas conhecidas.</p>	<p><u>RT-PCR E Sorologia</u>  <u>RT-PCR</u>                      - Soro se for 0º-5º dia do início dos sintomas <b>E</b>                      - Urina se estiver até 8º dia do início dos sintomas  <u>Sorologia</u>                      - Soro: 1ª. Coleta se estiver do 3º. – 5º. dia do início dos sintomas                      - Soro: 2ª. Coleta após 2 a 4 semanas da primeira coleta</p>	<p><u>Sorologia ou PCR</u>                      Dengue                      Chikungunya                      STORCH</p>
<p><b>Feto com alterações do SNC possivelmente relacionada a infecção pelo vírus zika durante a gestação</b></p> <p>– Achado ultrassonográfico de feto com circunferência craniana (CC) aferida menor que dois desvios padrões (&lt; 2 dp) abaixo da média para a idade gestacional acompanhada ou não de outras alterações do Sistema Nervoso Central (SNC).</p> <p>– Achado ultrassonográfico de feto com alteração SNC sugestivo de infecção congênita.</p>	<p><u>Sorologia da gestante para Zika vírus:</u>                      - 1ª. Coleta: momento da confirmação da microcefalia do feto                      - 2ª. Coleta: coletar soro da 2ª. a 4ª. semana após a primeira coleta</p> <p><u>No Parto:</u> Coletar amostras do sangue do cordão umbilical, LCR e placenta</p>	<p><u>Sorologia da gestante</u>                      Dengue                      Chikungunya                      STORCH</p>
<p><b>Aborto espontâneo decorrente de possível associação com infecção pelo vírus zika, durante a gestação</b></p> <p>– Aborto espontâneo de gestante com relato de exantema durante a gestação, sem outras causas identificadas.</p>	<p><u>RT-PCR</u>                      Coletar 1cm<sup>3</sup> de cada órgão a seguir: cérebro, fígado, coração, pulmão, rim e baço <b>E</b>                      Coletar 3cm<sup>3</sup> de placenta  <u>Imuno-histoquímico</u>                      Coletar 1cm<sup>3</sup> de cada órgão a seguir: cérebro, fígado, coração, pulmão, rim e baço</p>	<p><u>Sorologia da gestante</u>                      Dengue                      Chikungunya                      STORCH</p>

GRUPO	EXAME LABORATORIAL ESPECÍFICO PARA DIAGNOSTICO DE VÍRUS ZIKA	EXAME LABORATORIAL PARA OUTRAS CAUSAS INFECCIOSAS
<p><b>Natimorto decorrente de possível infecção pelo vírus zika durante a gestação</b></p> <p>– Natimorto de qualquer idade gestacional, de gestantes com relato de doença exantemática durante a gestação.</p>	<p><u>RT-PCR</u> Coletar 1cm<sup>3</sup> de cada órgão a seguir: cérebro, fígado, coração, pulmão, rim e baço <u>E</u> Coletar 3cm<sup>3</sup> de placenta <u>Imuno-histoquímico</u>  Coletar 1cm<sup>3</sup> de cada órgão a seguir: cérebro, fígado, coração, pulmão, rim e baço</p>	<p><u>Sorologia da gestante</u> Dengue Chikungunya STORCH</p>
<p><b>Recém-nascido vivo (RNV) com microcefalia possivelmente associada a infecção pelo vírus zika, durante a gestação</b></p> <p>– Recém-nascido vivo com menos de 37 semanas de idade gestacional, apresentando medida do perímetro cefálico abaixo do percentil 3, segundo a curva de Fenton, para o sexo.</p> <p>– Recém-nascido vivo com 37 semanas ou mais de idade gestacional, apresentando medida do perímetro cefálico menor ou igual a 32 cm, segundo as referências da OMS, para o sexo.</p>	<p>RT-PCR E Sorologia <u>RT-PCR</u> a) Placenta <u>E</u> b) Sangue do cordão umbilical ou do bebê <u>E</u> c) Líquor do bebê <u>Sorologia</u> a) Sangue do cordão umbilical OU do bebê <u>E</u> b) Líquor do bebê</p>	<p><u>Sorologia da gestante</u> Dengue Chikungunya STORCH</p>

# Capítulo V - Investigação epidemiológica

## Objetivos da Investigação Epidemiológica

### Geral

Avaliar e descrever o perfil clínico e epidemiológico dos casos de microcefalia, conforme definição de caso adotada.

### Específicos

- Descrever os casos segundo características de tempo, lugar e pessoa.
- Classificar os casos de acordo com o diagnóstico.
- Levantar hipóteses.
- Propor recomendações.

## Roteiro da investigação

É importante lembrar que as variáveis contidas no RESP e SINASC precisam ser complementadas. Por isso, recomenda-se que seja realizada a investigação domiciliar/hospitalar com a gestante/puérpera, para todos os casos suspeitos de microcefalia, utilizando-se um instrumento padronizado.

O questionário adotado na investigação do surto em Pernambuco poderá ser utilizado para investigação dos casos suspeitos (**Anexo 7**). O mesmo foi adaptado a partir dos instrumentos utilizados pelo Estudo Colaborativo Latino-americano de Malformações Congênitas (ECLAMC).

Como se trata de agravo inusitado, sem padrão epidemiológico plenamente conhecido e sem descrição na literatura, recomenda-se que todos os casos suspeitos sejam investigados. Como algumas Unidades Federadas podem vir a apresentar um grande número de casos, pode-se iniciar a investigação priorizando os casos residentes na capital ou no município que concentre o maior número de casos.

Outro critério para priorizar os casos a serem investigados é selecionar as gestantes/puérperas que apresentem histórico de exantema durante a gestação. Para isso, pode-se usar os dados do RESP ou, quando não houver essa informação, pode-se realizar contato telefônico para obter esse dado antes de realizar a visita domiciliar/hospitalar.

Para os municípios e Unidades Federadas que utilizarem o modelo de questionário sugerido, o MS criou o questionário (máscara) para entrada dos dados no software Epi Info 7 (extensão .mdb). Para digitar os dados, deve-se baixar o programa gratuitamente no link <http://wwwn.cdc.gov/epiinfo/7/> e seguir as instruções de instalação, digitação e transferência dos dados para o MS, que encontram-se disponíveis nos anexos.

## Entrevistas com as gestantes/puérperas

É importante que o entrevistador solicite os dados da Caderneta da Gestante e, se for o caso, a Caderneta da Criança para consultar os dados sobre o pré-natal e nascimento registrados nesses documentos. Outros documentos de registro também são válidos para consulta das informações, desde que tenham sido preenchidos por profissionais de saúde ou emitidos por estabelecimentos de saúde como,

por exemplo, cartões de gestante de consultórios particulares, laudos de resultados de exames clínicos e de imagem.

Orienta-se a coleta dos dados a partir de registros de serviços de saúde, como por exemplo, prontuários médicos, laudos em serviços de diagnóstico, caso a gestante/puérpera não tenha os dados necessários para preenchimento do questionário de investigação.

## Capítulo VI - Monitoramento e Análise dos Dados

### Requisitos para acesso ao painel de monitoramento do RESP (Monitor RESP)

Para garantir o desempenho adequado é necessário possuir as configurações mínimas de:

- Acesso à Internet
- Estação de trabalho
- Programas
- Browser

#### Acesso à internet

Para acessar o RESP, o computador ou a rede de computadores é necessário ter os seguintes requisitos mínimos:

- Velocidade mínima recomendada para um computador — Banda larga entre 300 kbps a 600 kbps.
- Velocidade mínima recomendada para mais de um computador conectado em rede — Banda larga superior a 600 kbps.

#### Estação de trabalho

- Microcomputador com CPU Pentium IV 2 GHz
- Sistema Operacional Windows XP/Professional ou mais recente — 1 GB de memória.

#### Programas

Os seguintes programas devem estar instalados na estação de trabalho para que seja possível visualização dos relatórios e dos arquivos:

- Adobe Reader
- Microsoft Office Excel

#### Navegadores de internet

O Monitor RESP funciona sobre a plataforma de Inteligência de Negócios ou (BI – Business Intelligence) e foi desenvolvido para ser utilizado no Internet Explorer, Firefox e Chrome, sendo necessárias as versões:

- Internet Explorer — Versão 8.0 ou superior
- Mozilla Firefox — 20 ou superior
- Chrome – 24 ou superior

# Capítulo VII - Medidas de prevenção e controle

## Manejo Integrado de Vetores (MIV)

Um programa operacional de controle efetivo para o vetor transmissor da dengue fornece as bases para uma preparação adequada contra os vírus Zika e Chikungunya (CHIKV), uma vez que os três vírus são transmitidos pelo mesmo mosquito o *Aedes aegypti*. Portanto, para responder à introdução e disseminação do vírus Zika, Chikungunya e Dengue, recomenda-se utilizar e intensificar as ações integradas de vigilância e controle do vetor desenvolvidas para a dengue, conforme preconizado nas **Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue (2009)**, que seguem os preceitos estabelecidos pela Estratégia de Gestão Integrada da Dengue nas Américas (EGI-dengue).

Para garantir o êxito do componente de MIV, é fundamental contar com a participação e a colaboração intersetorial em todos os níveis de governo e dos órgãos de saúde, educação, meio ambiente, desenvolvimento social e turismo, entre outros. O MIV é baseado também na participação de organizações não governamentais (ONGs) e organizações privadas, buscando-se a participação de toda a comunidade. Ressalta-se a importância de fornecer informações claras e de qualidade sobre a doença por intermédio dos meios de comunicação. Considerando a alta infestação por *Aedes aegypti*, bem como a presença do *Aedes albopictus* no país, recomenda-se que as medidas de prevenção e controle sejam orientadas para reduzir a densidade do vetor.

Portanto, é necessário:

- Intensificar as ações de controle do *Aedes aegypti*, principalmente a eliminação de criadouros do vetor nos domicílios, pontos estratégicos (PE) e áreas comuns de bairros e cidades (por exemplo, parques, escolas e prédios públicos);
- Organizar campanhas de limpeza urbana para eliminação de depósitos em áreas específicas em que a coleta de lixo não é regular;
- Implementar medidas de controle nos locais de reprodução do vetor através da utilização dos métodos preconizados nas diretrizes nacionais: eliminação e tratamento de depósitos, envolvendo ativamente os moradores e a comunidade por intermédios de ações educativas;
- Definir as áreas de alta vulnerabilidade de transmissão e priorizar locais onde há concentração de pessoas (por exemplo, escolas, terminais, hospitais, centros de saúde);
- Em áreas onde forem detectados casos de Zika vírus, chikungunya e dengue, sugere-se a realização de bloqueio de casos com equipamentos portáteis de Ultrabaixo Volume (UBV) para eliminação dos mosquitos adultos infectados, com o intuito de bloquear a propagação da transmissão. Por se tratar do mesmo vetor do vírus Zika, estas ações poderão impactar a transmissão desta doença. Deve-se considerar também a utilização de equipamentos montados em veículos (UBV pesado) nas áreas com transmissão intensa. Ressalta-se que esta ação é excepcional e só é eficaz quando executada com pessoal adequadamente capacitado e treinado de acordo com as orientações técnicas do Ministério da Saúde. Além disso, a ação deve ser realizada em conjunto com as demais atividades de controle preconizadas. Observação: o uso de UBV tem maior eficiência quando utilizados equipamentos portáteis, incluindo a nebulização do peri-domicílio;

- Escolher adequadamente o inseticida a ser utilizado, em concordância com as recomendações do WHOPES/OMS, do Ministério da Saúde e dos dados relativos à resistência das populações de mosquito aos inseticidas;
- Realizar a manutenção para o funcionamento adequado dos equipamentos, além de contar com um estoque estratégico de inseticidas para realização da atividade;
- Intensificar as ações de supervisão do trabalho de campo, tanto do tratamento focal como das atividades de nebulização espacial.

É importante ressaltar que a aplicação integral (simultânea ou coordenada) das ações de controle vetorial – controle de adultos e larvas, capacitação de pessoal, ações de limpeza urbana e atividades de mobilização social e comunicação com a comunidade – é essencial para obter um impacto maior no menor tempo possível.

Diante da **suspeita** ou **confirmação** de casos de infecção pelo vírus Zika, **declarar** “alerta de potencial ocorrência de casos de microcefalias”.

## Medidas de prevenção pessoal

Considerando relação entre a ocorrência de microcefalia e a infecção pelo vírus Zika, recomenda-se aos serviços e profissionais de saúde que informem a todas as gestantes e mulheres em idade fértil, com possibilidade de engravidar, que:

- Atualizar as vacinas de acordo com o calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde:
  - A rede pública do SUS oferece vacinas eficazes e gratuitas. Verifique quais são recomendadas para sua faixa etária e idade gestacional;
  - É importante lembrar que as vacinas geralmente têm um período que varia entre 10 dias e 6 semanas até atingir a proteção esperada. Por isso, devem ser aplicadas com a devida antecedência;
- Informar à gestante sobre o risco relacionado ao uso de medicamentos com potencial teratogênico;
- Orientar sobre a necessidade de atenção sobre a natureza e a qualidade daquilo que se ingere (água, alimentos, medicamentos) ou tem contato, e o potencial desses produtos afetarem o desenvolvimento do bebê;
- Proteger-se das picadas de insetos durante a gestação:
  - Evite horários e lugares com presença de mosquitos;
  - Sempre que possível utilize roupas que protejam partes expostas do corpo;
  - Consulte o médico sobre o uso de repelentes e verifique atentamente no rótulo as orientações quanto à concentração e frequência de uso recomendada para gestantes;
  - Permanecer, principalmente no período entre o anoitecer e o amanhecer, em locais com barreiras para entrada de insetos como: telas de proteção, mosquiteiros, ar-condicionado ou outras disponíveis.
- Se houver qualquer alteração no seu estado de saúde, principalmente no período até o 4º mês de gestação, ou na persistência de doença pré-existente nessa fase, comunique o fato aos

profissionais de saúde (médicos obstetras, médico ultrassonografista e demais componentes da equipe de saúde) para que tomem as devidas providências para acompanhamento da gestação;

- Para minimizar o contato vetor-paciente, recomenda-se:
  - A pessoa infectada repousar sob mosquiteiros impregnados ou não com inseticida;
  - O paciente e os demais membros da família devem usar mangas compridas para cobrir as extremidades;
  - Usar telas protetoras nas portas e janelas.

Pessoas infectadas com os vírus Zika, Chikungunya ou Dengue são o reservatório de infecção para outras pessoas, tanto em casa como na comunidade. Portanto, medidas de proteção pessoal para minimizar a exposição dos pacientes aos mosquitos tornam-se imperativas para evitar a propagação do vírus e, conseqüentemente, da doença.

É importante informar a pessoa infectada e outros membros da família e da comunidade sobre os métodos para minimizar este risco, tanto por intermédio da redução da população do vetor como da possibilidade de contato entre o vetor e as pessoas.

### **Sobre as vacinas incluídas no Calendário Nacional de Imunização**

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é responsável pelo repasse aos Estados dos imunobiológicos que fazem parte dos calendários de vacinação. As vacinas ofertadas pelo PNI são seguras e não há evidência na literatura nacional e internacional de que possam causar microcefalia. Estão à disposição em todos os postos de vacinação, sendo aplicadas por equipes de profissionais periodicamente capacitados em relação às atividades de imunização normatizadas por meio de manuais e notas técnicas que estão disponíveis em cada sala de vacina do Estado e do País.

Independente de todas essas precauções, assim como os medicamentos, nenhuma vacina está livre totalmente de provocar eventos adversos. Porém, os riscos de complicações graves causadas pelas vacinas são muito menores do que os das doenças contra as quais elas protegem. Além disso, sabe-se que muitos dos eventos adversos são meramente associações temporais, não se devendo ao uso das vacinas. A grande frequência de quadros infecciosos e de natureza alérgica na população, bem como os quadros neurológicos que eclodem inevitavelmente com ou sem vacinação, tornam comuns estas associações temporais, especialmente em crianças.

A ocorrência de um evento adverso após imunização não prova que a vacina provocou os sinais ou sintomas. As vacinas são aplicadas em lactentes e crianças durante um período de suas vidas em que certas condições clínicas tornam-se manifestas com maior frequência (por exemplo, distúrbios neurológicos). Uma vez que a associação de um evento adverso com o momento da administração de uma vacina específica comumente ocorre ao acaso, a verdadeira associação causal requer que o evento ocorra numa taxa significativamente maior em receptores da vacina do que em grupos não vacinados de idade e local de residência semelhante. Acúmulo fora do habitual, em associação temporal, de um determinado evento adverso com vacinação anterior, reforça a hipótese de associação causal.

Durante o procedimento de administração das vacinas, o usuário ou o seu responsável é orientado a retornar ao serviço de saúde caso apresente eventos adversos pós-vacinais. Assim, quando eles ocorrem, há necessidade de criteriosa investigação clínica e laboratorial desses casos, visando o diagnóstico

diferencial e o tratamento com a finalidade de que o evento adverso, a sequela ou mesmo o óbito não sejam atribuídos à vacina sem fundamentação científica. Muitos destes eventos são doenças intercorrentes que ocorrem em associação temporal com a vacinação.

No Brasil, eventos adversos associados à vacinação são acompanhados através do Sistema de Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinação/SIAPV, que tem como objetivo avaliar de forma continuada a relação de risco-benefício quanto ao uso dos imunobiológicos, bem como permitir o acompanhamento da situação das notificações/investigações em tempo real nas três esferas de governo.

### ***Importante***

Até o momento, não existe na literatura médica nacional e internacional evidências sobre a associação do uso de vacinas com a microcefalia.

A vacina contra a influenza pode ser seguramente e efetivamente administrada a partir de seis meses de idade e durante qualquer trimestre da gestação. Nenhum estudo até o momento demonstrou um risco aumentado de complicações maternas ou desfechos fetais adversos (mortes fetais, malformação, etc.) associados a ela. Além disso, não existe evidência científica de que as vacinas inativadas de influenza sejam uma causa de eventos adversos entre crianças nascidas de mulheres que receberam esta vacina durante a gestação.

Em relação ao componente rubéola, está incluído nas vacinas dupla viral (sarampo e rubéola) e tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola). Estas vacinas são compostas por vírus vivos atenuados, sendo contraindicadas na gestação, inclusive com a recomendação da pessoa não engravidar por um mês após a vacinação.

### **Sobre o uso de repelentes de inseto durante a gravidez**

Produtos repelentes de uso tópico podem ser utilizados por gestantes, desde que estejam devidamente registrados na ANVISA e que sejam seguidas as instruções de uso descritas no rótulo.

Estudos conduzidos em humanos durante o segundo e o terceiro trimestre de gestação e em animais durante o primeiro trimestre indicam que o uso tópico de repelentes a base de n,n-Dietil-meta-toluamida (DEET) por gestantes é seguro.

Produtos à base de DEET não devem ser usados em crianças menores de 2 anos. Em crianças entre 2 e 12 anos, a concentração deve ser no máximo 10% e a aplicação deve se restringir a 3 vezes por dia. Concentrações superiores a 10% são permitidas para maiores de 12 anos.

Além do DEET, no Brasil são utilizadas em cosméticos as substâncias repelentes Hydroxyethyl isobutyl piperidine carboxylate (Icaridin ou Picaridin) e Ethyl butylacetylaminopropionate (EBAAP ou IR3535), além de óleos essenciais, como Citronela. Embora não tenham sido encontrados estudos de segurança realizados em gestantes, estes ingredientes são reconhecidamente seguros para uso em produtos cosméticos conforme compêndios de ingredientes cosméticos internacionais.

Nos Estados Unidos, os produtos repelentes são regularizados pela United States Environmental Protection Agency (EPA). As seguintes substâncias estão presentes em produtos regularizados pela EPA: Catnip oil, Óleo de citronela; DEET; IR 3535; p-Menthane-3,8-diol e 2-undecanone ou methyl nonyl ketone. Portanto, os ativos utilizados no Brasil estão dentre os utilizados nos Estados Unidos.

O Center for Disease Control e Prevention (CDC), também nos Estados Unidos, recomenda o uso de produtos repelentes por gestantes, uma vez que a EPA não estabelece nenhuma restrição nesse sentido. Entretanto, destaca que as recomendações de uso da rotulagem devem ser consideradas.

A consulta de cosméticos repelentes regularizados na ANVISA pode ser feita no endereço [http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta\\_Produto/consulta\\_cosmetico.asp](http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto/consulta_cosmetico.asp).

### Uso de repelentes ambientais para controle do mosquito da dengue e orientações sobre sua utilização por grávidas

Produtos saneantes repelentes e inseticidas podem ser utilizados em ambientes frequentados por gestantes, desde que estejam devidamente registrados na ANVISA e que sejam seguidas as instruções de uso descritas no rótulo.

A ANVISA não permite a utilização de substâncias que sejam comprovadamente carcinogênicas, mutagênicas ou teratogênicas em produtos saneantes. Entretanto, como os produtos são destinados a superfícies e ambientes, não são apresentados estudos com aplicação direta em pessoas, o que significa que uma superexposição da gestante ao produto pode não ser segura. Dessa forma, a segurança para a utilização desses produtos em ambientes frequentados por gestantes depende da estrita obediência a todos os cuidados e precauções descritas nos rótulos dos produtos.

Um exemplo de restrição trazida no rótulo é: “Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos”.

Os produtos comumente utilizados no combate e/ou no controle da população do mosquito *Aedes aegypti* são:

#### **Inseticidas:**

Indicados para matar os mosquitos adultos e são encontrados principalmente em spray e aerossol. Os inseticidas possuem substâncias ativas que matam os mosquitos e componentes complementares, tais como solubilizantes e conservantes.

#### **Repelentes:**

Apenas afastam os mosquitos do ambiente, podendo ser encontrados na forma de espirais, líquidos e pastilhas utilizadas em aparelhos elétricos, por exemplo. Os repelentes utilizados em aparelhos elétricos ou espirais não devem ser utilizados em locais com pouca ventilação nem na presença de pessoas asmáticas ou com alergias respiratórias. Podem ser utilizados em qualquer ambiente da casa desde que estejam no mínimo a 2 metros de distância das pessoas;

Os inseticidas “naturais” à base de citronela, andiroba, óleo de cravo, entre outros, não possuem comprovação de eficácia nem a aprovação pela ANVISA até o momento. Os produtos que se encontram atualmente regularizados na ANVISA com tais componentes possuem sempre outra substância como

princípio ativo. Portanto, todos os produtos apregoados como “naturais”, comumente comercializados como velas, odorizantes de ambientes, limpadores e os incensos que indicam propriedades repelentes de insetos, não estão aprovados pela Agência e estão irregulares.

A consulta de produtos saneantes regularizados na ANVISA pode ser feita nos endereços abaixo:

- Registrados: [http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta\\_Produto/consulta\\_saneante.asp](http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto/consulta_saneante.asp)
- Notificados: <http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Notificado/Saneantes/NotificadoSaneante.asp>

## Educação em saúde, comunicação e mobilização social

Recomenda-se a definição de um porta-voz para transmitir informações atualizadas e orientar a população sobre:

- A eliminação de criadouros dos mosquitos;
- O ciclo do mosquito;
- Os depósitos predominantes do vetor e as localidades com maior concentração de mosquito ou/casos da doença;
- Os sinais e sintomas da doença;
- Os perigos da automedicação, em especial o uso do ácido acetilsalicílico e seus derivados;
- A necessidade de procurar a unidade básica de saúde ao surgirem os primeiros sintomas.

# Referências



1. Organization WH, (U.S.) C for DC and P, Systems IC for BDM. Birth defects surveillance: a manual for programme managers [Internet]. World Health Organization; 2014 [cited 2015 Dec 5]. Available from: <http://www.who.int/iris/handle/10665/110223>
2. Duncan BB, Schmidt MI, Giugliani ERJ, Duncan MS, Giugliani C. Medicina Ambulatorial - 4.ed.: Conduas de Atenção Primária Baseadas em Evidências [Internet]. 2014 [cited 2015 Dec 6]. Available from: <https://books.google.com/books?hl=pt-BR&lr=&id=4HZQBAAQBAJ&pgis=1>
3. Peñas JJ, Andújar FR. Alteraciones del perímetro craneal: microcefalia y macrocefalia. *Pediatr Integr*. 2003;7:587–600.
4. Leibovitz Z, Daniel-Spiegel E, Malinger G, Haratz K, Tamarkin M, Gindes L, et al. Microcephaly at birth - the accuracy of three references for fetal head circumference. How can we improve prediction? *Ultrasound Obstet Gynecol* [Internet]. 2015 Oct 29 [cited 2015 Dec 6]; Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26511765>
5. Harris SR. Measuring head circumference: Update on infant microcephaly. *Can Fam physician Médecin Fam Can* [Internet]. 2015 Aug [cited 2015 Dec 6];61(8):680–4. Available from: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=4541430&tool=pmcentrez&rendertype=abstract>
6. Alcantara D, O’Driscoll M. Congenital microcephaly. *Am J Med Genet C Semin Med Genet* [Internet]. 2014 Jun [cited 2015 Dec 2];166C(2):124–39. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24816482>
7. Ashwal S, Michelson D, Plawner L, Dobyns WB. Practice parameter: Evaluation of the child with microcephaly (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. *Neurology* [Internet]. 2009 Sep 15 [cited 2015 Dec 6];73(11):887–97. Available from: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2744281&tool=pmcentrez&rendertype=abstract>
8. Oliveira WK de, Coelho GE, França GVA de. Boletim Epidemiológico - Situação epidemiológica de ocorrência de microcefalias no Brasil, 2015. *Bol Epidemiológico da SVS/MS* [Internet]. 2015;46(34):1–3. Available from: <http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/novembro/19/Microcefalia-bol-final.pdf>
9. ECDC. RAPID RISK ASSESSMENT Microcephaly in Brazil potentially linked to the Zika virus epidemic - 24 November 2015 [Internet]. Stockholm: Rapid Risk Assessment; 2015. Available from: <http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/zika-microcephaly-Brazil-rapid-risk-assessment-Nov-2015.pdf>
10. Brasil/MS. Ministério da Saúde confirma relação entre vírus Zika e microcefalia, 28 de novembro de 2015. [Internet]. Nota à imprensa. 2015 [cited 2015 Dec 6]. Available from: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/21014-ministerio-da-saude-confirma-relacao-entre-virus-zika-e-microcefalia>
11. Balm MND, Lee CK, Lee HK, Chiu L, Koay ESC, Tang JW. A diagnostic polymerase chain reaction assay for Zika virus. *J Med Virol* [Internet]. 2012 Sep 18 [cited 2015 Nov 17];84(9):1501–5. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22825831>
12. ECDC. Rapid Risk Assessment - Zika virus infection outbreak, French Polynesia - 14 february 2014 [Internet]. Stockholm; 2014. Available from: <http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Zika-virus-French-Polynesia-rapid-risk-assessment.pdf>
13. SVS/MS. NOTA À IMPRENSA: SVS monitora casos de doença exantemática no Nordeste - 29 de abril de 2015. [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2015. Available from: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/noticias-svs/17524-svs-monitora-casos-de-doenca-exantematica-no-nordeste>
14. Campos GS, Bandeira AC, Sardi SI. Zika Virus Outbreak, Bahia, Brazil. *Emerg Infect Dis* [Internet]. 2015 Oct [cited 2015 Oct 23];21(10):1885–6. Available from: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=4593454&tool=pmcentrez&rendertype=abstract>
15. Cardoso CW, Paploski IAD, Kikuti M, Rodrigues MS, Silva MMO, Campos GS, et al. Outbreak of Exanthematous Illness Associated with Zika, Chikungunya, and Dengue Viruses, Salvador, Brazil. *Emerg Infect Dis* [Internet]. 2015 Dec [cited 2015 Nov 23];21(12):2274–6. Available from:

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26584464>

16. SVS/MS. NOTA À IMPRENSA - Confirmação do Zika Vírus no Brasil - 14 de maio de 2015 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2015. Available from: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/noticias-svs/17702-confirmacao-do-zika-virus-no-brasil>
17. Nhan T-X, Cao-Lormeau V-M, Musso D. Les infections à virus Zika. Rev Francoph des Lab [Internet]. 2014 Dec [cited 2015 Oct 20];2014(467):45–52. Available from: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1773035X14727480>
18. Musso D, Cao-Lormeau VM, Gubler DJ. Zika virus: following the path of dengue and chikungunya? Lancet (London, England) [Internet]. Elsevier; 2015 Jul 18 [cited 2015 Nov 24];386(9990):243–4. Available from: <http://www.thelancet.com/article/S0140673615612739/fulltext>
19. Oliveira WK de, Neto DLR, França GVA de, Coelho GE, Zoca B de O. Monitoramento dos casos de microcefalias no Brasil, até a semana epidemiológica 02, 2016 [Internet]. Epidemiologia e Serviços de Saúde. Brasília: SciELO Brasil; 2015. p. 1–5. Available from: <http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/21/COES-Microcefalias---Informe-Epidemiol--gico-SE-02-2016.pdf>
20. PAHO. Alerta Epidemiológica - Síndrome neurológico, anomalias congénitas e infección por vírus Zika. Implicaciones para la salud pública en las Américas. 1 de diciembre de 2015 [Internet]. Washington: Pan American Health Organization; 2015. Available from: [http://www.paho.org/hq/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&Itemid=270&gid=32404&lang=es](http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=32404&lang=es)
21. Freire CC de M, Iamarino A, Neto DF de L, Sall AA, Zanotto PM de A. Spread of the pandemic Zika virus lineage is associated with NS1 codon usage adaptation in humans [Internet]. bioRxiv. Cold Spring Harbor Labs Journals; 2015 Nov. Available from: <http://biorxiv.org/content/early/2015/11/25/032839.abstract>
22. Detection of Zika Virus in Urine - Volume 21, Number 1—January 2015 - Emerging Infectious Disease journal - CDC [Internet]. [cited 2015 Dec 7]. Available from: [http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/21/1/14-0894\\_article](http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/21/1/14-0894_article)
23. Musso D, Roche C, Nhan T-X, Robin E, Teissier A, Cao-Lormeau V-M. Detection of Zika virus in saliva. J Clin Virol [Internet]. 2015 Jul [cited 2015 Dec 7];68:53–5. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26071336>
24. Besnard M, Lastère S, Teissier A, Cao-Lormeau V, Musso D. Evidence of perinatal transmission of Zika virus, French Polynesia, December 2013 and February 2014. Eurosurveillance [Internet]. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) - Health Communication Unit; 2014 Apr 3 [cited 2015 Nov 12];19(13):20751. Available from: <http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20751>
25. CDC/EUA. Zika Virus [Internet]. Web. 2015 [cited 2015 Dec 6]. Available from: <http://www.cdc.gov/zika/index.html>
26. Oehler E, Watrin L, Larre P, Lepercq-Goffart I, Lastere S, Valour F, et al. Zika virus infection complicated by Guillain-Barre syndrome--case report, French Polynesia, December 2013. Euro Surveill [Internet]. 2014 Jan [cited 2015 Dec 7];19(9). Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24626205>


# Anexos

## Anexo 1. Curvas de crescimento de Fenton para crianças (pré-termo)



Fonte: Fenton, Tanis R and Kim, Jae H. A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants. BMC Pediatric. 2013; 13: 59. Published online 2013 April 20. doi: 10.1186/1471-2431-13-59. <http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2431-13-59.pdf>

Anexo 2. Tabela de referência OMS simplificada, para medida do perímetro cefálico (em centímetros) de meninos do nascimento até 2 anos de idade, por desvio padrão em relação.



O Ministério adota o padrão da OMS, conforme Caderneta de Saúde da Criança, sendo considerado padrão abaixo do esperado para a idade quando estiver abaixo de 2 (dois) desvios-padrão equivalente a 32 cm – em vermelho.

Anos	Meses	MENINOS COM MAIS DE 37 SEMANAS DE IDADE GESTACIONAL DESVIO PADRÃO (EM CENTÍMETROS)						
		-3DP	-2DP	-1DP	MEDIANA	+1DP	+2DP	+3DP
Nascimento	0	30,7	31,9	33,2	34,5	35,7	37,0	38,3
< 1 ano	1	33,8	34,9	36,1	37,3	38,4	39,6	40,8
< 1 ano	2	35,6	36,8	38,0	39,1	40,3	41,5	42,6
< 1 ano	3	37,0	38,1	39,3	40,5	41,7	42,9	44,1
< 1 ano	4	38,0	39,2	40,4	41,6	42,8	44,0	45,2
< 1 ano	5	38,9	40,1	41,4	42,6	43,8	45,0	46,2
< 1 ano	6	39,7	40,9	42,1	43,3	44,6	45,8	47,0
< 1 ano	7	40,3	41,5	42,7	44,0	45,2	46,4	47,7
< 1 ano	8	40,8	42,0	43,3	44,5	45,8	47,0	48,3
< 1 ano	9	41,2	42,5	43,7	45,0	46,3	47,5	48,8
< 1 ano	10	41,6	42,9	44,1	45,4	46,7	47,9	49,2
< 1 ano	11	41,9	43,2	44,5	45,8	47,0	48,3	49,6
1 ano	12	42,2	43,5	44,8	46,1	47,4	48,6	49,9
1 ano	13	42,5	43,8	45,0	46,3	47,6	48,9	50,2
1 ano	14	42,7	44,0	45,3	46,6	47,9	49,2	50,5
1 ano	15	42,9	44,2	45,5	46,8	48,1	49,4	50,7
1 ano	16	43,1	44,4	45,7	47,0	48,3	49,6	51,0
1 ano	17	43,2	44,6	45,9	47,2	48,5	49,8	51,2
1 ano	18	43,4	44,7	46,0	47,4	48,7	50,0	51,4
1 ano	19	43,5	44,9	46,2	47,5	48,9	50,2	51,5
1 ano	20	43,7	45,0	46,4	47,7	49,0	50,4	51,7
1 ano	21	43,8	45,2	46,5	47,8	49,2	50,5	51,9
1 ano	22	43,9	45,3	46,6	48,0	49,3	50,7	52,0
1 ano	23	44,1	45,4	46,8	48,1	49,5	50,8	52,2
2 anos	24	44,2	45,5	46,9	48,3	49,6	51,0	52,3

Fonte: OMS - tabelas simplificadas -


[http://www.who.int/childgrowth/standards/second\\_set/sft\\_hcfa\\_boys\\_z\\_0\\_5.pdf?ua=1](http://www.who.int/childgrowth/standards/second_set/sft_hcfa_boys_z_0_5.pdf?ua=1)

[http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta\\_saude\\_crianca\\_menino.pdf](http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_crianca_menino.pdf)

Anexo 3. Curvas de crescimento da OMS para meninas do nascimento até 13 semanas e até 2 anos, em percentis.

## Head circumference-for-age GIRLS


Birth to 13 weeks (percentiles)



WHO Child Growth Standards

## Head circumference-for-age GIRLS

Birth to 2 years (percentiles)




WHO Child Growth Standards

Fonte: OMS. Curvas de circunferência da cabeça por idade. [http://www.who.int/childgrowth/standards/hc\\_for\\_age/en/](http://www.who.int/childgrowth/standards/hc_for_age/en/)

Anexo 4. Curvas de crescimento da OMS para meninos do nascimento até 13 semanas e até 2 anos, em percentis.

## Head circumference-for-age BOYS


Birth to 13 weeks (percentiles)



WHO Child Growth Standards

## Head circumference-for-age BOYS

Birth to 2 years (percentiles)



WHO Child Growth Standards

Fonte: OMS. Curvas de circunferência da cabeça por idade. [http://www.who.int/childgrowth/standards/hc\\_for\\_age/en/](http://www.who.int/childgrowth/standards/hc_for_age/en/)

### NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE MICROCEFALIA

1. DATA DA NOTIFICAÇÃO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

#### DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA GESTANTE OU PUÉRPERA

2. NOME DA MÃE: \_\_\_\_\_

3. NÚMERO DO PRONTUÁRIO:  
\_\_\_\_\_

4. TIPO DE DOCUMENTO: [ ] CPF [ ] CARTÃO SUS  
[ ] CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG) [ ] SEM DOCUMENTO

5. NÚMERO DO CARTÃO SUS, CPF OU RG:  
\_\_\_\_\_

6. DATA DE NASCIMENTO DA MÃE: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

7. IDADE DA MÃE: \_\_\_\_\_

8. UF DE RESIDÊNCIA: \_\_\_\_\_

9. MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA: \_\_\_\_\_

10. BAIRRO: \_\_\_\_\_

11. CEP: \_\_\_\_\_

12. LOGRADOURO (RUA, AVENIDA...): \_\_\_\_\_

13. NÚMERO: \_\_\_\_\_

14. PONTO DE REFERÊNCIA: \_\_\_\_\_

15. TELEFONE DDD: \_\_\_\_\_

16. TELEFONE: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

#### IDENTIFICAÇÃO RECÉM-NASCIDO OU LACTENTE

17. NOME DO RN OU LACTENTE: \_\_\_\_\_

18. SEXO: [ ] 1. MASCULINO [ ] 2. FEMININO [ ] 3. INDETERMINADO [ ] 9. NÃO INFORMADO

19. DATA DE NASCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

20. PESO (GRAMA): \_\_\_\_\_

21. COMPRIMENTO (CM): \_\_\_\_\_

22. NÚMERO DA DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO: \_\_\_\_\_

23. NÚMERO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO: \_\_\_\_\_

#### GESTAÇÃO E PARTO

24. DETECÇÃO DE MICROCEFALIA NO PERÍODO: [ ] INTRAUTERINO [ ] PÓS-PARTO

25. IDADE GESTACIONAL NA  
DETECÇÃO DA MICROCEFALIA  
(EM SEMANAS): \_\_\_\_\_

26. CLASSIFICAÇÃO DO RN DE ACORDO COM A IDADE GESTACIONAL:

[ ] 1. PRÉ-TERMO [ ] 2. TERMO [ ] 3. PÓS-TERMO [ ] NÃO SE APLICA (AINDA GESTANTE)

27. TIPO DE GRAVIDEZ:

[ ] ÚNICA [ ] DUPLA [ ] TRIPLA [ ] >3

28. PERÍMETRO CEFÁLICO (CM) –  
TERMO: \_\_\_\_\_

29. PERÍMETRO CEFÁLICO (DESVIO  
PADRÃO) – PRÉ TERMO:  
\_\_\_\_\_

30. DIÂMETRO CEFÁLICO (CM) SE DETECTADO NO INTRAÚTERO: \_\_\_\_\_

**DADOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DA MÃE**

- |   |   |
|---|---|
| 31. APRESENTOU FEBRE DURANTE A GESTAÇÃO:<br>[ ] SIM [ ] NÃO<br>[ ] NÃO SABE   | 32. APRESENTOU EXANTEMA DURANTE A GESTAÇÃO:<br>[ ] 1. SIM, NO 1º TRIMESTRE [ ] 2. SIM, NO 2º TRIMESTRE [ ] 3. SIM, NO 3º TRIMESTRE [ ] 4. SIM, MAS NÃO LEMBRA A DATA OU PERÍODO GESTACIONAL [ ] 5. NÃO APRESENTOU EXANTEMA [ ] NÃO SABE |
| 33. REALIZOU EXAME PARA, PELO MENOS, UM DOS STORCH (SÍFILIS, TOXOPLASMOSE, OUTROS RUBÉOLA, CITOMEGALOVÍRUS E HERPES VÍRUS) NA GESTAÇÃO OU PÓS-PARTO:<br>[ ] 1. SIM [ ] 2. NÃO [ ] 3. NÃO SABE | 34. REALIZOU EXAME PARA DENGUE, CHIKUNGUNYA OU ZIKA VÍRUS, NA GESTAÇÃO OU PÓS-PARTO:<br>[ ] 1. SIM [ ] 2. NÃO [ ] 3. NÃO SABE   |

**LOCAL DE OCORRÊNCIA DO PARTO/MATERNIDADE**

- |  |                             |                      |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 35. CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (CNES): _____                       | 36. UF: _____               | 37. MUNICÍPIO: _____ |
| 38. ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (HOSPITAL, MATERNIDADE ETC):<br>_____         |                             |                      |
| 39. ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO (RUA, TRAVESSA, AV, BAIRRO ETC.):<br>_____ |                             |                      |
| 40. TELEFONE DDD: _____  | 41. TELEFONE: _____ - _____ |                      |

**DADOS DO NOTIFICADOR**

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 42. NOME DO NOTIFICADOR: _____ |                             |
| 43. E-MAIL: _____              |                             |
| 44. TELEFONE DDD: _____        | 45. TELEFONE: _____ - _____ |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

INSTRUÇÃO: informe o resultado dos exames laboratoriais realizados para STORCH (sífilis, toxoplasmose, outras doenças infecciosas, rubéola, citomegalovírus ou herpes vírus); informe se foi testado para dengue, chikungunya ou zika vírus; se o médico suspeitou clinicamente de zika vírus ou outras infecções durante a gestação; se usou medicamentos durante a gestação - quais; se é usuária de drogas - quais e frequência; conclusão do laudo de exames de imagem (ultrassom, ressonância, tomografia) e informe se há presença de calcificações na imagem ou outra informação relevante.

## 46. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


## Anexo 6. Acesso ao Monitor RESP

Para ter acesso ao Monitor RESP, o usuário deve realizar login previamente cadastrado junto ao Datasus.

### Tela de entrada no Monitor RESP

1. Para acessar a página, digite o endereço <http://dw.saude.gov.br> no navegador e tecle Enter. Surgirá a tela:
  - a. Digite o usuário e a senha e, em seguida, clique em Login.


**Figura 1. Acesso ao Monitor RESP**



### Acesso aos Dados

2. Clicar sobre o ícone MICROCEFALIA, conforme indicado na figura abaixo.


**Figura 2. Acesso ao Projeto Microcefalia**



3. Após clicar sobre o ícone MICROCEFALIA aparecerá a tela Home, conforme figura 3. São apresentadas as seguintes funcionalidades:
  - **Procurar:** Relatórios Compartilhados, Meus Relatórios e Lista de Históricos;

- **Analisar:** Criar dashboard;
- **Desenvolver:** Criar relatório, Criar Documento e Criar Filtro.

**Figura 3. Tela Home**



## Módulo I – Relatórios Compartilhados

### Acesso aos Dados

4. Para acessar a base de dados, o usuário deve clicar na opção Relatórios Compartilhados no ícone (figura 4) ou no menu lateral esquerdo (figura 5) para ter acesso à planilha de dados.

**Figura 4. Relatórios Compartilhados**





Figura 5. Relatórios Compartilhados



5. A tela seguinte apresenta os ícones Painel e Microcefalia. Para acesso aos dados, há duas opções: a primeira é clicar no próprio ícone: Microcefalias (Figura 6).

Figura 6. Ícone para apresentação do Relatório de Microcefalia




Figura 7. Para exportar clique em Planilha




Figura 8. Para exportar clique em exportar




Figura 9. Escolha o formato e configuração de sua preferência







Figura 10. Clique no botão Exportar



**Figura 11.** Para abrir o arquivo exportado procure em sua área de download padrão ou clique no ícone do arquivo em seu navegador.



**Figura 12.** Para abrir o Painel de Monitoramento para visualizar sem necessidade de download, clique em Relatórios compartilhados



**Figura 13.** Para abrir o Painel de Monitoramento para visualizar sem necessidade de download, clique em Relatórios compartilhados




Figura 14. Clique na opção Mapa




Figura 15. A partir desse momento, você poderá clicar nas opções do menu superior e navegar entre as visualizações padronizadas.



### Dados do serviço de saúde

**Tipo:**  Hospital público  Hospital particular  Hospital filantrópico  Domicílio  Outros. Se outros, especificar: \_\_\_\_\_

**Identificação do serviço de saúde:** \_\_\_\_\_

**Município de ocorrência:** \_\_\_\_\_

**Prontuário:** \_\_\_\_\_

### Dados do recém-nascido

#### Informações gerais

**Data da ocorrência do parto:** \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Sexo:**  Masculino  Feminino  Indeterminado **Idade gestacional:** \_\_\_\_\_ semanas \_\_\_\_ dias

**Classificação quanto à idade gestacional:**  Pré-termo  Termo  Pós-termo

**Gemelar:**  Sim  Não. Se sim, especificar:  1º Gemelar  2º Gemelar  3º Gemelar

**Tipo de parto:**  Normal (Vaginal)  Fórceps  Cesáreo

**Ocorreu dano perinatal?**  Sim  Não – Se sim, qual:  Anóxico  Isquêmico  hemorrágico  traumático  outros, especificar: \_\_\_\_\_

#### Exame físico ao nascer

<b>Peso (g):</b>	<b>Estatura (cm):</b>	<b>Perímetro cefálico (cm):</b>	<b>Perímetro torácico (cm):</b>
<b>Índice de Apgar:</b>	<b>1º min:</b>	<b>5º min:</b>	<b>10º min:</b>

**Presença de outras malformações:**  Sim  Não

Se sim, especificar:

Aparelho circulatório

Aparelho respiratório

Aparelho digestivo

Órgãos genitais

Aparelho osteomuscular

Descreva a malformação encontrada: \_\_\_\_\_

**Houve outros achados clínicos?**  Sim  Não – Se sim, especificar:

icterícia

hidropsia

petéquias

anemia

rinite muco-sanguinolenta

plaquetopenia

esplenomegalia

hepatomegalia

convulsões

alterações ósseas

lesões cutâneas

outras, especificar: \_\_\_\_\_

choro ao manuseio

pseudoparalisia

#### Exames inespecíficos

**Hemograma (considerar o primeiro):**  Sim  Não - Data da realização: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Hb (mg/dl)	Ht (%)	Leucócitos (mm <sup>3</sup> )	Bastonetes (%)	Segmentados (%)	Monócitos (%)	Linfócitos (%)	Plaquetas (mm <sup>3</sup> )	Glicose (mg/dl)

**Punção líquórica:** [ ] Sim [ ] Não – Data da realização: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Aspecto: [ ] Límpido [ ] Purulento [ ] Hemorrágico [ ] Turvo [ ] Xantocrômico [ ] Outros [ ] Ignorado

Hemácias (mm <sup>3</sup> )	Leucócitos (mm <sup>3</sup> )	Bastonetes (%)	Segmentados (%)	Monócitos (%)	Linfócitos (%)	Proteínas (mg/dl)	Cloreto (mg/dl)	Glicose (mg/dl)

### Exames etiológicos

**Atenção! Preencher os resultados conforme a legenda:**

**[1] Reagente/Positivo [2] Não reagente/Negativo [3] Inconclusivo [4] Não realizado**

Agente	Amostra	Data coleta	IgM	IgG	PCR
Rubéola	Soro do RN				
	Líquor				
	Urina				
Agente	Amostra	Data coleta	IgM	IgG	PCR
Citomegalovírus	Soro do RN				
	Líquor				
	Urina				
Agente	Amostra	Data coleta	IgM	IgG	PCR
Herpes vírus	Soro do RN				
	Líquor				
	Urina				
Agente	Amostra	Data coleta	IgM	IgG	PCR
Parvovírus	Soro do RN				
	Líquor				
	Urina				
Agente	Amostra	Data coleta	IgM	IgG	PCR
Toxoplasmose	Soro do RN				
	Líquor				
	Urina				
Agente	Amostra	Data coleta	Resultado	Titulação	Treponêmico
Sífilis	Soro do RN			1:	
	Líquor			1:	
	Urina			1:	
Agente	Amostra	Data coleta	Teste rápido	Sorologia	WB
HIV	Soro do RN				
Agente	Amostra	Data coleta	IgM	IgG	PCR
Zika vírus	Soro do RN				
	Líquor				
	Urina				
Agente	Amostra	Data coleta	IgM	IgG	PCR
Chikungunya	Soro do RN				
	Líquor				
	Urina				
Agente	Amostra	Data coleta	IgM	IgG	PCR
Dengue	Soro do RN				
	Líquor				
	Urina				

## Exames de imagem

**Tomografia craniana:**  Sim  Não  Aguardando – Se sim, data da realização: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Resultado:  Normal  calcificações  lisencefalia  atrofia cerebral  ventriculomegalia  suturas calcificadas  
 outras, especificar: \_\_\_\_\_

**Ressonância magnética craniana:**  Sim  Não  Aguardando – Se sim, data da realização: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Resultado:  Normal  calcificações  lisencefalia  atrofia cerebral  ventriculomegalia  suturas calcificadas  
 outras, especificar: \_\_\_\_\_

**Ultrassom transfontanela:**  Sim  Não  Aguardando – Se sim, data da realização: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Resultado:  Normal  calcificações  lisencefalia  atrofia cerebral  ventriculomegalia  suturas calcificadas  
 outras, especificar: \_\_\_\_\_

**Ultrassom abdominal:**  Sim  Não  Aguardando – Se sim, data da realização: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Foi encontrada alguma alteração:  Sim  Não – Se sim, especificar: \_\_\_\_\_

**Ecocardiograma:**  Sim  Não  Aguardando – Se sim, data da realização: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Foi encontrada alguma alteração:  Sim  Não  – Se sim, especificar: \_\_\_\_\_

## Outros exames realizados

**Fundo do olho:**  Sim  Não – Se sim, data da realização: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Foi encontrada alguma alteração:  Sim  Não  – Se sim, especificar: \_\_\_\_\_

**Teste da orelhinha:**  Sim  Não – Se sim, data da realização: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Foi encontrada alguma alteração:  Sim  Não  – Se sim, especificar: \_\_\_\_\_

## Entrevista com a mãe

### Identificação e dados sociodemográficos

Nome: \_\_\_\_\_

Data de nascimento: \_\_/\_\_/\_\_ \_\_\_\_ Idade: \_\_\_\_ anos

Raça/Cor:  Branca  Preta  Amarela  Parda  Indígena (Etnia: \_\_\_\_\_)  Ignorado

Escolaridade (considerar o maior nível completo):  Sem escolaridade  Fundamental I  Fundamental II  
 Médio  Superior  Ignorado

Estado civil:  Solteira  Casada  Viúva  Separada/Divorciada  União estável  Ignorado

Ocupação: \_\_\_\_\_

Quantas pessoas moram na sua casa: \_\_\_\_\_

Qual é a renda familiar mensal: \_\_\_\_\_ reais

### Endereço atual

Estado: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_

Logradouro: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_ Telefones: \_\_\_\_\_

Morou em outro endereço durante a gestação?  Sim  Não – Se sim:

Estado: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_

Logradouro: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_

**Viajou durante a gestação?** [ ] Sim [ ] Não – Se sim:

Data da Ida: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data da Volta: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ País: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_ Município: \_\_\_\_\_

Data da Ida: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data da Volta: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ País: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_ Município: \_\_\_\_\_

### **Antecedentes**

**Há algum grau de parentesco com o seu companheiro?** [ ] Sim [ ] Não – Se sim, qual: \_\_\_\_\_

**Você possui alguma malformação congênita?** [ ] Sim [ ] Não – Se sim, qual (is): \_\_\_\_\_

**Há alguém na sua família, ou na do seu companheiro, que nasceu com microcefalia?** [ ] Sim [ ] Não

**Você fazia uso de algum medicamento de uso contínuo?** [ ] Sim [ ] Não – Se sim, Especificar: \_\_\_\_\_

**Teve diagnóstico de alguma doença pré-existente?** [ ] Sim [ ] Não – Se sim, qual (is):

[ ] Diabetes [ ] Outras doenças metabólicas [ ] Hipertensão arterial sistêmica [ ] Cardiopatia crônica [ ] Doença renal crônica [ ] Pneumopatias crônicas [ ] Hemoglobinopatia [ ] Câncer [ ] Doença auto-imune [ ] Doença neuroléptica [ ] Outras, especificar: \_\_\_\_\_

**Teve diagnóstico ou recebeu tratamento para alguma doença sexualmente transmissível?** [ ] Sim [ ] Não

Se sim, qual (is): [ ] HIV [ ] Sífilis [ ] Gonorreia [ ] Clamídia [ ] Hepatites B e/ou C [ ] Herpes simples

[ ] Outras, especificar: \_\_\_\_\_

### **Histórico obstétrico/ginecológico**

**Primeira gestação?** [ ] Sim [ ] Não – Se sim, pular para dados da gestação. Se não, continuar:

**Quantas vezes você já engravidou (considerar abortos e natimortos)?** \_\_\_\_\_

**Quantos filhos nasceram vivos?** \_\_\_\_\_

**Quantos filhos nasceram mortos?** \_\_\_\_\_

**Já teve algum aborto?** [ ] Sim [ ] Não – Se sim, quantos: \_\_\_\_\_

**Algum destes nasceu com alguma malformação congênita?** [ ] Sim [ ] Não – Se sim, qual (is):

\_\_\_\_\_  
**Qual é a data de nascimento do seu último filho?** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

### **Durante a gestação**

**Teve contato com pesticidas?** [ ] Sim [ ] Não – Se sim, especificar: \_\_\_\_\_

**Teve contato com agrotóxicos?** [ ] Sim [ ] Não – Se sim, especificar: \_\_\_\_\_

**Teve contato com algum produto químico?** [ ] Sim [ ] Não – Se sim, especificar: \_\_\_\_\_

**Realizou algum exame de raio-X?** [ ] Sim [ ] Não – Se sim: [ ] 1º trimestre [ ] 2º trimestre [ ] 3º trimestre

### **Você fez uso de algum destes medicamentos?**

**Ácido fólico:** [ ] Sim [ ] Não – Se sim, data que iniciou o tratamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Ferro:** [ ] Sim [ ] Não – Se sim, data que iniciou o tratamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Outros:** [ ] Sim [ ] Não Se sim: Quais:

Medicamento 1: \_\_\_\_\_ data que iniciou o tratamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Medicamento 2: \_\_\_\_\_ data que iniciou o tratamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Medicamento 3: \_\_\_\_\_ data que iniciou o tratamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Medicamento 4: \_\_\_\_\_ data que iniciou o tratamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Você teve manchas vermelhas no corpo durante a gestação? [ ] Sim [ ] Não – Se sim, continuar:

1º. Trimestre [ ]	2º. Trimestre [ ]	3º. Trimestre [ ]
<p><b>Data do início do exantema:</b> ___/___/___</p> <p><b>Durou por quantos dias?</b> _____</p> <p><b>Iniciou aonde?</b> [ ] Cabeça/pescoço [ ] Tronco [ ] MMSS [ ] MMII [ ] Difuso por todo corpo</p> <p><b>Ela se espalhou?</b> [ ] Sim [ ] Não</p> <p><b>Se sim, para onde?</b> [ ] Cabeça/pescoço [ ] Tronco [ ] MMSS [ ] MMII [ ] Difuso por todo corpo</p>	<p><b>Data do início do exantema:</b> ___/___/___</p> <p><b>Durou por quantos dias?</b> _____</p> <p><b>Iniciou aonde?</b> [ ] Cabeça/pescoço [ ] Tronco [ ] MMSS [ ] MMII [ ] Difuso por todo corpo</p> <p><b>Ela se espalhou?</b> [ ] Sim [ ] Não</p> <p><b>Se sim, para onde?</b> [ ] Cabeça/pescoço [ ] Tronco [ ] MMSS [ ] MMII [ ] Difuso por todo corpo</p>	<p><b>Data do início do exantema:</b> ___/___/___</p> <p><b>Durou por quantos dias?</b> _____</p> <p><b>Iniciou aonde?</b> [ ] Cabeça/pescoço [ ] Tronco [ ] MMSS [ ] MMII [ ] Difuso por todo corpo</p> <p><b>Ela se espalhou?</b> [ ] Sim [ ] Não</p> <p><b>Se sim, para onde?</b> [ ] Cabeça/pescoço [ ] Tronco [ ] MMSS [ ] MMII [ ] Difuso por todo corpo</p>
<p><b>Teve algum dos seguintes sinais e sintomas?</b></p> <p>[ ] Febre - se sim, qual temperatura? _____</p> <p>[ ] Prurido</p> <p>[ ] Tosse</p> <p>[ ] Coriza</p> <p>[ ] Cefaleia</p> <p>[ ] Mialgia</p> <p>[ ] Artralgia – se sim, quanto tempo? _____</p> <p>[ ] Linfadenopatia</p> <p>[ ] Hiperemia conjuntival</p> <p>[ ] Vômitos</p> <p>[ ] Dor retroorbital</p> <p>[ ] Outros, especificar: _____</p> <p><b>Se teve outros sintomas,</b></p> <p><b>o rash surgiu:</b> [ ] Primeiro [ ] Logo após [ ] Dias após os outros sintomas</p> <p><b>Teve atendimento médico?</b> [ ] Sim [ ] Não</p> <p><b>Se sim, qual hipótese diagnóstica?</b> _____</p> <p><b>Tomou remédio?</b> [ ] Sim [ ] Não</p> <p><b>Se sim, qual?</b> _____</p>	<p><b>Teve algum dos seguintes sinais e sintomas?</b></p> <p>[ ] Febre - se sim, qual temperatura? _____</p> <p>[ ] Prurido</p> <p>[ ] Tosse</p> <p>[ ] Coriza</p> <p>[ ] Cefaleia</p> <p>[ ] Mialgia</p> <p>[ ] Artralgia – se sim, quanto tempo? _____</p> <p>[ ] Linfadenopatia</p> <p>[ ] Hiperemia conjuntival</p> <p>[ ] Vômitos</p> <p>[ ] Dor retroorbital</p> <p>[ ] Outros, especificar: _____</p> <p><b>Se teve outros sintomas,</b></p> <p><b>o rash surgiu:</b> [ ] Primeiro [ ] Logo após [ ] Dias após os outros sintomas</p> <p><b>Teve atendimento médico?</b> [ ] Sim [ ] Não</p> <p><b>Se sim, qual hipótese diagnóstica?</b> _____</p> <p><b>Tomou remédio?</b> [ ] Sim [ ] Não</p> <p><b>Se sim, qual?</b> _____</p>	<p><b>Teve algum dos seguintes sinais e sintomas?</b></p> <p>[ ] Febre - se sim, qual temperatura? _____</p> <p>[ ] Prurido</p> <p>[ ] Tosse</p> <p>[ ] Coriza</p> <p>[ ] Cefaleia</p> <p>[ ] Mialgia</p> <p>[ ] Artralgia – se sim, quanto tempo? _____</p> <p>[ ] Linfadenopatia</p> <p>[ ] Hiperemia conjuntival</p> <p>[ ] Vômitos</p> <p>[ ] Dor retroorbital</p> <p>[ ] Outros, especificar: _____</p> <p><b>Se teve outros sintomas,</b></p> <p><b>o rash surgiu:</b> [ ] Primeiro [ ] Logo após [ ] Dias após os outros sintomas</p> <p><b>Teve atendimento médico?</b> [ ] Sim [ ] Não</p> <p><b>Se sim, qual hipótese diagnóstica?</b> _____</p> <p><b>Tomou remédio?</b> [ ] Sim [ ] Não</p> <p><b>Se sim, qual?</b> _____</p>

## Hábitos durante a gestação

### Álcool

#### Fez uso de bebida alcoólica durante a gestação?

Sim  Não –Se não, pular para tabagismo. Se sim, continuar.

#### Com que frequência você utilizava bebidas alcoólicas por semana?

Uma  duas  três  quatro  cinco  seis  sete ou mais

#### Quantas doses ou drinks você costumava tomar nesses dias?

Uma  duas  três ou mais

#### Com que frequência tomava mais que três doses ou drinks na mesma ocasião?

Nunca  mensalmente ou menos  Mensalmente  Semanalmente  Diariamente  Ignorada

### Tabagismo

#### Em relação ao cigarro, você diria que:

Nunca fumei

Fumei no passado, mas na gestação não

Fumei de menos que 10 cigarros por dia

Fumei de 10 a 20 cigarros por dia

Fumei mais de 20 cigarros por dia

Não soube responder

Se fumante, há quantos anos fuma diariamente? \_\_\_\_\_

Se ex-fumante, parou de fumar há quanto tempo? \_\_\_\_\_  dias  semanas  meses  anos

### Drogas ilícitas

#### Agora nos vamos falar sobre o uso de substâncias estimulantes ou calmantes. Alguma vez você usou:

**Maconha** -  Nunca  Nenhuma vez no último ano antes de ficar grávida  uma vez por mês pelo menos  mais ou menos uma vez por semana  todos os dias

**Cocaína cheirada** -  Nunca  Nenhuma vez no último ano antes de ficar grávida  uma vez por mês pelo menos  mais ou menos uma vez por semana  todos os dias

**Qualquer droga injetável** -  Nunca  Nenhuma vez no último ano antes de ficar grávida  uma vez por mês pelo menos  mais ou menos uma vez por semana  todos os dias

**Crack ou merla** -  Nunca  Nenhuma vez no último ano antes de ficar grávida  uma vez por mês pelo menos  mais ou menos uma vez por semana  todos os dias

**Lança-perfume, loló, cola, éter, solventes, esmalte, tinta, clorofórmio** -  Nunca  Nenhuma vez no último ano antes de ficar grávida  uma vez por mês pelo menos  mais ou menos uma vez por semana  todos os dias

**LSD** -  Nunca  Nenhuma vez no último ano antes de ficar grávida  uma vez por mês pelo menos  mais ou menos uma vez por semana  todos os dias

**Ecstasy** -  Nunca  Nenhuma vez no último ano antes de ficar grávida  uma vez por mês pelo menos  mais ou menos uma vez por semana  todos os dias

**Anfetamina ou remédios para emagrecer** -  Nunca  Nenhuma vez no último ano antes de ficar grávida  uma vez por mês pelo menos  mais ou menos uma vez por semana  todos os dias

### Dados do pré-natal (cartão da gestante e outros registros)

**Realizou pré-natal:**  Sim  Não. Se sim, continuar:

**Unidade de saúde que realizou pré-natal:** \_\_\_\_\_

**Município de realização do pré-natal:** \_\_\_\_\_

**Número de consultas:** 1º trimestre: \_\_\_\_\_ 2º trimestre: \_\_\_\_\_ 3º trimestre: \_\_\_\_\_ Total: \_\_\_\_\_

**Data da primeira consulta:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ **Idade gestacional no momento da 1ª consulta:** \_\_\_\_\_ semanas

**Peso no início da gestação (kg):** \_\_\_\_\_ **Peso no final da gestação (kg):** \_\_\_\_\_ **Altura (m):** \_\_\_\_\_

### Histórico vacinal

Imunobiológico	Tomou vacina?	Nº Doses	Data 1º Dose	Data 2º Dose	Data 3º Dose
Influenza	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
dT	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
DTPa					
Hepatite B	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
Tríplice viral	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				

**Desenvolveu alguma complicação durante a gestação?**  Sim  Não – Se sim, qual:

Infecção do trato urinário

Anemia

Diabetes gestacional

Hipertensão arterial sistêmica gestacional

Pré-eclampsia

Placenta prévia

Oligodrômio

Polidrômio

Insuficiência do colo uterino

Hiperemese gravídica

Anomalias anatômicas do útero

Deslocamento de placenta

Crescimento intrauterino restrito

Incisura

Outras – Especificar \_\_\_\_\_

### Exames de ultrassonografia

Data realização	Idade gestacional	Perímetro cefálico (cm)	Microcefalia	Calcificações	Ventriculomegalia	Outros achados
/ /	Semanas		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
/ /	Semanas		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
/ /	Semanas		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
/ /	Semanas		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
/ /	Semanas		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
/ /	Semanas		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	

## Exames realizados

Exame	1º Trimestre			2º trimestre			3º trimestre		
	Realizado	Data	Resultado	Realizado	Data	Resultado	Realizado	Data	Resultado
Hemoglobina	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	____(d/dL)	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	____(d/dL)	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	____(d/dL)
Hematócrito	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	____(%)	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	____(%)	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	____(%)
Glicose	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	____(mg/dL)	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	____(mg/dL)	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	____(mg/dL)
Anti-HIV	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	( ) Reagente ( ) Não reagente ( ) Inconclusivo	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	( ) Reagente ( ) Não reagente ( ) Inconclusivo	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	( ) Reagente ( ) Não reagente ( ) Inconclusivo
Rubéola	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	( ) IgM reagente ( ) IgM não reagente ( ) Inconclusivo ( ) IgG reagente ( ) IgG não reagente ( ) Inconclusivo	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	( ) IgM reagente ( ) IgM não reagente ( ) Inconclusivo ( ) IgG reagente ( ) IgG não reagente	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	( ) IgM reagente ( ) IgM não reagente ( ) Inconclusivo ( ) IgG reagente ( ) IgG não reagente
HBSAg	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	( ) Reagente ( ) Não reagente ( ) Inconclusivo	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	( ) Reagente ( ) Não reagente ( ) Inconclusivo	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	( ) Reagente ( ) Não reagente ( ) Inconclusivo
Anti-HCV	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	( ) Reagente ( ) Não reagente ( ) Inconclusivo	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	( ) Reagente ( ) Não reagente ( ) Inconclusivo	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	( ) Reagente ( ) Não reagente ( ) Inconclusivo
Toxoplasmose	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	( ) IgM reagente ( ) IgM não reagente ( ) Inconclusivo ( ) IgG reagente ( ) IgG não reagente ( ) Inconclusivo	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	( ) IgM reagente ( ) IgM não reagente ( ) Inconclusivo ( ) IgG reagente ( ) IgG não reagente	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	( ) IgM reagente ( ) IgM não reagente ( ) Inconclusivo ( ) IgG reagente ( ) IgG não reagente
Sífilis (VDRL)	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	( ) Reagente ( ) Não reagente ( ) Inconclusivo	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	( ) Reagente ( ) Não reagente ( ) Inconclusivo	Sim ( ) Não ( )	__/__/__	( ) Reagente ( ) Não reagente ( ) Inconclusivo
Exame	1º Trimestre			2º trimestre			3º trimestre		
	Realizado	Data	Resultado	Realizado	Data	Resultado	Realizado	Data	Resultado

Citomegalovírus	Sim ( ) Não ( )	___/___/___	( ) IgM reagente ( ) IgM não reagente ( ) Inconclusivo ( ) IgG reagente ( ) IgG não reagente ( ) Inconclusivo	Sim ( ) Não ( )	___/___/___	( ) IgM reagente ( ) IgM não reagente ( ) Inconclusivo ( ) IgG reagente ( ) IgG não reagente	Sim ( ) Não ( )	___/___/___	( ) IgM reagente ( ) IgM não reagente ( ) Inconclusivo ( ) IgG reagente ( ) IgG não reagente
Herpes simples	Sim ( ) Não ( )	___/___/___	( ) IgM reagente ( ) IgM não reagente ( ) Inconclusivo ( ) IgG reagente ( ) IgG não reagente ( ) Inconclusivo	Sim ( ) Não ( )	___/___/___	( ) IgM reagente ( ) IgM não reagente ( ) Inconclusivo ( ) IgG reagente ( ) IgG não reagente	Sim ( ) Não ( )	___/___/___	( ) IgM reagente ( ) IgM não reagente ( ) Inconclusivo ( ) IgG reagente ( ) IgG não reagente
Outros	Sim ( ) Não ( )	___/___/___	( ) IgM reagente ( ) IgM não reagente ( ) Inconclusivo ( ) IgG reagente ( ) IgG não reagente ( ) Inconclusivo	Sim ( ) Não ( )	___/___/___	( ) IgM reagente ( ) IgM não reagente ( ) Inconclusivo ( ) IgG reagente ( ) IgG não reagente	Sim ( ) Não ( )	___/___/___	( ) IgM reagente ( ) IgM não reagente ( ) Inconclusivo ( ) IgG reagente ( ) IgG não reagente
Outros	Sim ( ) Não ( )	___/___/___	( ) IgM reagente ( ) IgM não reagente ( ) Inconclusivo ( ) IgG reagente ( ) IgG não reagente ( ) Inconclusivo	Sim ( ) Não ( )	___/___/___	( ) IgM reagente ( ) IgM não reagente ( ) Inconclusivo ( ) IgG reagente ( ) IgG não reagente	Sim ( ) Não ( )	___/___/___	( ) IgM reagente ( ) IgM não reagente ( ) Inconclusivo ( ) IgG reagente ( ) IgG não reagente

**Diagnóstico laboratorial de alguma doença infecciosa?**  Sim  Não – Se sim, qual:

<b>1º. Trimestre</b> [ ]	<b>2º. Trimestre</b> [ ]	<b>3º. Trimestre</b> [ ]
<input type="checkbox"/> Toxoplasmose	<input type="checkbox"/> Toxoplasmose	<input type="checkbox"/> Toxoplasmose
<input type="checkbox"/> Rubéola	<input type="checkbox"/> Rubéola	<input type="checkbox"/> Rubéola
<input type="checkbox"/> Citomegalovírus	<input type="checkbox"/> Citomegalovírus	<input type="checkbox"/> Citomegalovírus
<input type="checkbox"/> Sífilis	<input type="checkbox"/> Sífilis	<input type="checkbox"/> Sífilis
<input type="checkbox"/> Herpes simples	<input type="checkbox"/> Herpes simples	<input type="checkbox"/> Herpes simples
<input type="checkbox"/> Parvovírus	<input type="checkbox"/> Parvovírus	<input type="checkbox"/> Parvovírus
<input type="checkbox"/> HIV	<input type="checkbox"/> HIV	<input type="checkbox"/> HIV
<input type="checkbox"/> Dengue	<input type="checkbox"/> Dengue	<input type="checkbox"/> Dengue
<input type="checkbox"/> Chikungunya	<input type="checkbox"/> Chikungunya	<input type="checkbox"/> Chikungunya
<input type="checkbox"/> Zika vírus	<input type="checkbox"/> Zika vírus	<input type="checkbox"/> Zika vírus
<input type="checkbox"/> Outras. Especificar:	<input type="checkbox"/> Outras. Especificar:	<input type="checkbox"/> Outras. Especificar:

**Se sífilis reagente:**

- 1) Título 1: \_\_\_\_\_, recebeu tratamento:  Sim  Não – Se sim, data do início do tratamento: \_\_ / \_\_ / \_\_, parceiro tratado concomitante:  Sim  Não
- 2) Título 1: \_\_\_\_\_, recebeu tratamento:  Sim  Não – Se sim, data do início do tratamento: \_\_ / \_\_ / \_\_, parceiro tratado concomitante:  Sim  Não
- 3) Título 1: \_\_\_\_\_, recebeu tratamento:  Sim  Não – Se sim, data do início do tratamento: \_\_ / \_\_ / \_\_, parceiro tratado concomitante:  Sim  Não

**Encerramento do caso**

**Investigação concluída?**  Sim  Não. Se não, especificar:  Recusa  Perda  Em investigação

**Classificação final:**  Suspeito  provável  confirmado  descartado  inconclusivo

**Etiologia provável:**  infecciosa  genética/cromossômica  ambiental (fármacos, toxicológicas, radiações ionizantes, outras)  inconclusiva.

Se infecciosa, qual HD relacionada: \_\_\_\_\_

**Evolução:**  alta  óbito  Ignorado – Data da evolução: \_\_ / \_\_ / \_\_

**Observações**

---

---

---

---

---

**Dados do investigador**

Início da investigação: \_\_ / \_\_ / \_\_

Nome do investigador: \_\_\_\_\_

Fim da investigação: \_\_ / \_\_ / \_\_

Nome do investigador: \_\_\_\_\_