

**Superintendência de Políticas de Atenção Integral à Saúde
Gerência de Assistência Farmacêutica**

Orientação sobre Oseltamivir (Tamiflu) para crianças

Visto que o fabricante não disponibiliza a solução oral de oseltamivir, o Ministério da Saúde passou a distribuir o medicamento Oseltamivir (Tamiflu), em cápsulas de 30 mg e 45 mg, além da dosagem de 75 mg, já existente, estas destinadas a **crianças maiores de um ano**, conforme o peso da criança.

Para a administração desta medicação, recomendam-se os seguintes passos:

1. Verifique se você está usando a dose correta de acordo com a tabela abaixo

Para crianças MAIORES de um (1) ano (conforme o peso)

Peso da criança	Dose do Oseltamivir	Quantidade de cápsulas
10 a 14 kg	30 mg	01 cápsula de 12 em 12 hs, durante 05 dias
15 a 23 kg	45 mg	01 cápsula de 12 em 12 hs, durante 05 dias
23 a 40 kg	60 mg	02 cápsulas de 30 mg 12 em 12 hs, durante 05 dias
Acima de 40 Kg	75 mg	01 cápsula de 12 em 12 hs, durante 05 dias

Caso a criança não consiga deglutir a cápsula:

1. Pegue a(s) cápsula(s) e corte a ponta superior com uma tesoura (a tesoura deve ser lavada antes de usar);

2. Transfira todo o conteúdo da(s) cápsula(s) para uma colher;

3. Adicione ao pó da cápsula (na colher) uma pequena quantidade (1 colher de chá) de alimento adoçado como leite condensado, calda de chocolate, açúcar mascavo ou refinado dissolvido em água, cobertura de sobremesas, mel (apenas para crianças com dois anos de idade ou mais), calda de frutas ou iogurte, a fim de mascarar o sabor amargo do remédio. Misture bem;

4. Após misturar bem, administre todo o conteúdo da colher para o paciente.

Esta mistura deve ser administrada imediatamente após o seu preparo. Repita este procedimento para cada dose que será administrada.

DILUIÇÃO DO MEDICAMENTO OSELTAMIVIR EM DOSES PEDIÁTRICAS, A PARTIR DE CÁPSULAS DE 75 MG.

ATENÇÃO

Na indisponibilidade das apresentações pediátricas e nos casos de crianças menores de 01 ano, utilizar a cápsula de 75 mg para diluição, conforme segue:

1. Utilizar como dosador uma seringa de 10 ml;
2. Logo antes da administração oral, cortar a cápsula de 75 mg (tesoura limpa), colocar o pó da cápsula em um recipiente limpo (xícara). Com a seringa acrescentar 7,5 ml de água fervida e fria ou filtrada, adoçar com açúcar e misturar bem;
3. Aspirar com a seringa somente o volume adequado conforme a posologia descrita na prescrição médica (ver tabela abaixo) e aplicar na boca. Desprezar o volume excessivo que ficou no recipiente. Repita este procedimento para cada dose que será administrada.

Idade ou Peso da criança	Dose do Oseltamivir	Em ml (da Diluição de 75 mg em 7,5 ml de água)	Intervalo de Doses e Duração do Tratamento
Menor de 3 meses	12 mg	1,2 ml	12/12 hs, 05 dias
3 a 5 meses	20 mg	2,0 ml	12/12 hs, 05 dias
6 a 11 meses	25 mg	2,5 ml	12/12 hs, 05 dias
10 – 14 Kg	30 mg	3,0 ml	12/12 hs, 05 dias
15 – 23 Kg	45 mg	4,5 ml	12/12 hs, 05 dias
23 – 40 Kg	60 mg	6,0 ml	12/12 hs, 05 dias

O farmacêutico no momento da dispensação deverá realizar a orientação detalhada e cuidadosa da diluição a ser feita.