

**Título do projeto de pesquisa:** Estudo da Saúde Sexual e Reprodutiva das Mulheres Vivendo Com Hiv/Aids Em Goiás

**Pesquisadoras:**

- Sandra Maria Brunini de Souza
- Waldemar Naves do Amaral
- Marise Ramos de Souza

**Unidade da SES-GO:** SPAIS

**Tese de doutorado:** Desejo reprodutivo de mulheres vivendo com HIV/aids em Goiás

**RESUMO**

Objetivo: Estimar a prevalência e identificar os fatores associados ao desejo reprodutivo entre as mulheres vivendo com HIV/aids. Método: Estudo de corte transversal com 274 mulheres entre 18 e 49 anos vivendo com HIV/aids, destas 110 viviam com parceiros sorodiscordantes, atendidas nos Serviços de Referência da rede SUS e nas Organizações Não Governamentais que prestam assistência a pessoas que vivem com HIV no estado de Goiás, no período de setembro de 2015 a agosto de 2016. Realizado entrevista face-a-face com roteiro pré-estruturado. Prevalências de desejo reprodutivo foram estimadas com intervalo de confiança de 95% (95.0% IC). Regressão de Poisson foi utilizada para analisar os fatores associados ao desejo reprodutivo. Resultados: A prevalência de desejo reprodutivo entre as mulheres na amostra investigada foi de 25,9% (IC 95%: 21,1-31,4) e associado à idade inferior a 30 anos (IC 95%: 1,63-5,17), cor da pele negra (IC 95%: 1,16-4,49), desejo reprodutivo pelo parceiro (IC 95%: 3,47-16,42), não possuir filhos (IC 95%: 1,30-3,50), história de aborto (IC 95%: 1,01-2,72) e carga viral indetectável (IC 95%: 1,02-3,63). Entre as mulheres com parceiros sorodiscordantes a prevalência foi de 32,7% (IC 95%: 24,7-42,0) e os fatores associados foram a idade < 30 anos (IC 95%: 1,92-9,61), tempo de relacionamento < 2 anos (IC 95%: 1,01-4,99), desejo reprodutivo pelo parceiro (IC 95%: 2,59-29,41) e ausência de filhos (IC 95%: 1,10-7,17). Conclusão: Os estudos apontaram a prevalência de 25,9% de desejo reprodutivo entre as mulheres portadoras de HIV/aids no estado de Goiás, tendo como fatores associados à idade inferior a 30 anos, cor da pele negra, desejo reprodutivo pelo parceiro, não possuir filhos, história de aborto e carga viral indetectável. Entre as mulheres com HIV/aids com parceiros sorodiscordantes a prevalência do desejo reprodutivo foi de 32,7%, tendo com fatores preditores ao desejo reprodutivo idade < 30 anos, desejo reprodutivo pelo parceiro, tempo de relacionamento < 2 anos e ausência de filhos.

Palavras-chave: Desejo reprodutivo, saúde reprodutiva, gênero, mulher, HIV

Há cópia disponível na Biblioteca Ena Galvão da Escola de Saúde Pública de Goiás Cândido Santiago, no endereço Rua 26, n. 521, Jardim Santo Antônio, Goiânia-GO, CEP 74853-070.

Tese disponível na internet: <https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/7822>