

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO/2019/PNI/MS

Vacinas		BCG	Hepatite B	VORH Rotavírus	Pentavalente (DTP+Hib+ Hep B)	DTP	VIP e VOP	Pneumo 10	Meningo C	Febre Amarela	Tríplice Viral	Tetra Viral	Varicela monovalente	Hepatite A	HPV	Dupla Adulto	dTpa (adulto)
Protege contra		Formas graves da tuberculose	Hepatite B	Rotavírus	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e meningite por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	Difteria, Tétano e Coqueluche	Poliomielite	Pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo	Doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i>	Febre Amarela	Sarampo Caxumba e Rubéola	Sarampo Caxumba Rubéola e Varicela	Varicela	Hepatite A	HPV	Difteria e Tétano	Difteria, Tétano e Coqueluche
Grupo Alvo	Idade																
Criança	Ao nascer	Dose Única (1)	Dose ao nascer (2)														
	2 meses			1ª dose	1ª dose		1ª dose-VIP (1)	1ª dose									
	3 meses								1ª dose								
	4 meses			2ª dose	2ª dose		2ª dose-VIP (1)	2ª dose									
	5 meses								2ª dose								
	6 meses						3ª dose-VIP (1)										
	9 meses									Dose Única (3)							
	12 meses							Reforço (1)	1º Reforço (1)		1ª dose						
	15 meses					1º Reforço	1º Reforço VOPb (1)					Dose Única (1)		Dose Única (1)			
	4 anos					2º Reforço	2º Reforço VOPb (1)						2ª dose (5)				
9 anos														2 doses (8)			
Adolescente			3 doses (4)					2º Reforço entre 11 a 14 anos de idade (6)			2 doses (4)			2 doses	3 doses e reforço a cada 10 anos (4)	10 a 19 anos	
Adulto	20 a 59 anos		3 doses (4)							Dose Única (3)	Até 29 anos: 2 doses. Entre 30 a 49 anos: 1 dose. (4) e (7)				3 doses e reforço a cada 10 anos (4)	Profissional de Saúde: 1 dose + reforços a cada 10 anos (9)	
Idoso	60 anos ou mais		3 doses (4)												3 doses e reforço a cada 10 anos (4)		
Gestante			3 doses (4)												2 doses (4)	1 dose a cada gestação (10)	

(1) Até menor de 5 anos de idade;(2) Essa dose pode ser feita até 30 dias de vida do bebê;(3) Até 59 anos;(4) A depender da situação vacinal, completar esquema;(5) Pode ser feita até menor de 7 anos de idade. Profissionais de saúde que trabalham na área assistencial devem receber uma ou duas doses a depender do laboratório produtor;(6) Adolescentes de ambos os sexos de 11 a 14 anos, como dose única ou reforço a depender da situação vacinal;(7) Profissionais da saúde devem receber duas doses independente da idade; (8) Para meninas de 09 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos: 2 doses - 0, 6 meses a depender da situação vacinal. Adolescentes e adultos de 9 a 26 anos vivendo com HIV/aids: 3 doses - 0, 2 e 6 meses;(9) Profissionais de saúde e parceiras tradicionais, como dose complementar no esquema básico da dT e reforços a cada dez anos;(10) A partir da 20ª semana gestacional (até 45 dias após o parto).