


A sífilis é uma doença bacteriana sistêmica, de evolução crônica, causada pelo *Treponema pallidum*, curável e tem o tratamento garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Vigilância Epidemiológica da Sífilis

- Identificar os casos de sífilis adquirida e em gestantes para subsidiar as ações de prevenção e controle da sífilis e da sífilis congênita.
- Monitorar o perfil epidemiológico da sífilis adquirida e em gestantes e suas tendências.
- Monitorar os casos de sífilis adquirida em mulheres em idade fértil, intensificando-as nos pré-natal.
- Monitorar a sífilis adquirida de acordo com seu estadiamento.
- Desencadear a investigação das fontes de infecção e transmissão comuns.

Sífilis Série histórica



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Fonte: <https://indicadores.saude.gov.br/public/ist.html>.

Dados atualizados em 26.02.24.


*Dados preliminares para os anos de 2023 e 2024, sujeitos a revisão.

SÍFILIS SE 01 a 08/2024 - GOIÁS


Nº02 26/02/2024

Sífilis Adquirida


2024



Faixa Etária



Nº de casos diagnosticados segundo Região de Saúde



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Fonte: <https://indicadores.saude.go.gov.br/public/ist.html>.

Dados atualizados em 26.02.24.

*Dados preliminares para os anos de 2023 e 2024, sujeitos a revisão.

SÍFILIS SE 01 a 08/2024 - GOIÁS


Nº02 26/02/2024

Sífilis em Gestantes


2024

141 casos

Faixa Etária



Nº de casos diagnosticados segundo Região de Saúde



Fonte: <https://indicadores.saude.gov.br/public/ist.html>.

Dados atualizados em 26.02.24.

*Dados preliminares para os anos de 2023 e 2024, sujeitos a revisão.



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde




SÍFILIS SE 01 a 08/2024 - GOIÁS

Nº02 26/02/2024

Sífilis Congênita

2024


52 casos




Município de Residência N° de Casos

Goiânia	26
Anápolis	10
Formosa	5
Luziânia	3
Planaltina	1
Catalão	1
Porangatu	1
Paranaiguara	1
Jataí	1
Aragarças	1
Iaciara	1


Período de Diagnóstico da Sífilis Materna



Esquema de Tratamento Materno



Realizou Pré-natal



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Fonte: <https://indicadores.saude.go.gov.br/public/ist.html>.

Dados atualizados em 26.02.24.

*Dados preliminares para os anos de 2023 e 2024, sujeitos a revisão.

Definição de Caso

SÍFILIS ADQUIRIDA

Situação 1: Indivíduo assintomático, com teste não treponêmico reagente com qualquer titulação e teste treponêmico reagente.

Situação 2: Indivíduos sintomáticos para sífilis, com pelo menos um teste reagente - treponêmico ou não treponêmico, com qualquer titulação.

SÍFILIS EM GESTANTE

Situação 1: Mulher assintomática para sífilis que, durante o pré-natal, parto e/ou puerpério, apresenta, ao menos, um teste reagente - treponêmico ou não treponêmico, com qualquer titulação e sem registro de tratamento prévio.

Situação 2: Mulher sintomática para sífilis que, durante o pré-natal, parto e/ou puerpério, apresenta, ao menos, um teste reagente - treponêmico ou não treponêmico, com qualquer titulação.

Situação 3: Mulher que, durante o pré-natal, parto e/ou puerpério, apresenta teste não treponêmico e teste treponêmico reagente, independente da sintomatologia da sífilis e sem história de tratamento prévio.

SÍFILIS CONGÊNITA

Situação 1: Todo recém-nascido, natimorto ou aborto de mulher com sífilis não tratada ou tratada inadequadamente*

Situação 2: Toda criança com menos de 13 anos de idade e, pelo menos, uma das seguintes situações:

- Alteração clínica, líquórica ou radiológica de sífilis congênita e teste não treponêmico não reagente;
- Títulos de testes não treponêmicos do lactente maior que os da mãe em, pelo menos, duas diluições de amostras de sangue periférico coletadas simultaneamente;
- Títulos de testes não treponêmicos ascendentes em, pelo menos, duas diluições;
- Títulos de testes não treponêmicos ainda reagentes após seis meses de idade, exceto em situações de seguimento;
- Testes treponêmicos reagentes após os 18 meses de idade, sem diagnóstico prévio de sífilis congênita.

***Tratamento adequado:** tratamento completo para o estágio clínico da sífilis com penicilina benzatina e **INICIADO ATÉ 30 DIAS** antes do parto. Gestantes que não se enquadrarem nesses critérios serão consideradas como tratadas de forma inadequada. Para fins de definição do caso, não se considera tratamento da parceria sexual da mãe.

Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância em Saúde : Volume 2. Brasília, 2023. Disponível em <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-contenido/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-2-6a-edicao/view>.

SÍFILIS SE 01 a 08/2024 - GOIÁS

Nº02 26/02/2024

Ficha de Notificação

Sífilis Congênita



Sífilis em Gestantes



Sífilis Adquirida



Disponível em: <http://portalsinan.saude.gov.br>

Superintendência de Vigilância em Saúde - SUVISA
Gerência de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis - GVEDT
Coordenação de Vigilância das IST's
vigilanciadasists@gmail.com
(62) 3201 - 3596



COORDENAÇÃO
DE VIGILÂNCIA
DAS ISTs SUVISA



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde

